

IVAN DE AZEVEDO SA FREIRE

MEDICAMENTOS:

SINTOMAS/QUEIXAS

BANHEIRO

HORA QUE ACORDA

HORA QUE DORME

PRATICA EXERCICIO

HORARIO DAS REFEIÇÕES

CAFE:

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTA:

01/09 P= 10.1 /cmH₂O

22 IAH= 12.2 /h

M. de uso: 3h55'

dua

05/09 P= 11.8 cmH₂O

22 IAH= 12.4 /h

M. de uso: 4h35'

dua

12/05

P= 9.3 - mediana / (95%) 11.2 cmH₂O.

23

IAH= 2.6 e/h

TROCO o filtro.

M. de uso: 4h

Relata melhora do cansaço; c/ dificuldade de iniciar sono.

dua

06/06 trocou a máscara.

dua

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: IVAN DE AZEVEDO SA FREIRE			
Sexo: M	Idade: 32 anos	Peso: 116 Kg	Altura: 1,79 m
IMC: 36,2	Data do Exame: 26/06/2019	Exame: 20006_01	
Médico solicitante: DR GUILHERME			

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 21:36:14 horas e encerrado às 06:00:03 horas, com latência para o sono de 77 minutos. Latência para o sono REM de 354 minutos. O tempo total de sono foi de 165,5 minutos, com eficiência do sono de 32,6%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1,8%	Até 5%
Estágio 2	94,0%	45 - 55%
Estágio 3	2,4%	> 15%
Sono REM	1,8%	20 - 25%
Eficiência do sono	32,6%	> 85%

No período total de sono permaneceu 342,0 minutos acordado e ocorreram 191 micro despertares (índice de 39,2/hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 71 bpm, a maior de 93 bpm e a menor de 59 bpm.

Foram identificados 0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora.

Ocorreram 199 eventos respiratórios, sendo 0 central, 199 obstrutivos e 0 misto. O índice de apnéia/hipopnéia total foi 72,1/hora, sendo 64,5 apnéia/hora e 7,6 hipopnéia/hora. O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 100,0/hora, sendo 100,0 apnéia/hora e 0,0 hipopnéia/hora.

A saturação basal da oxihemoglobina foi de 95%, sendo a saturação média de 90%, a maior de 98% e a mínima de 56%, permanecendo 129,2 minutos (25,4%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 34,6 minutos (6,8%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 205 dessaturações.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Registro de ronco.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono reduzida.

Rosemeiry Tereza Marçal
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 71200