

Exame

Nome	Maria Madalena Sepolini de Godoy	Nascimento	13/05/1947 (78 anos)	Sexo	Feminino
Início	07/10/2025 - 00:00:52	Tempo total	05:50:52 (350,9 min)		
Fim	07/10/2025 - 05:51:44	Tempo válido	05:38:56 (338,9 min)		

Condições na noite do exame


- ☐ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☐ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☒ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Resultado


Índice de dessaturações de oxigênio (IDO)^{1,2}



Valores de referência

IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Tempo com SpO₂ < 90%




Carga hipóxica⁴ • Risco cardiovascular

30 %min/hora


0 Risco menor

Risco maior 300+

Risco de FA^{5,6,7}



Intensidade do ronco registrado




Exame de polissonografia realizado no dia 07/10/2025, iniciado às 00:00 e terminado às 05:51. O tempo total de registro foi de 5h50min (350 minutos) e o tempo válido foi de 5h38min (338 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 19 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 3,4/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 92% e permaneceu abaixo de 90% durante 12% do tempo de registro (41 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 1% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame normal (IDO 3,4/hora), nas condições descritas e com o uso de CPAP. O tempo com SpO₂ abaixo de 90% é compatível com dessaturação significativa.



Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Exame

Nome	Maria Madalena Sepolini de Godoy	Nascimento	13/05/1947 (78 anos)	Sexo	Feminino
Início	07/10/2025 - 00:00:52	Tempo total	05:50:52 (350,9 min)		

Ficha médica

Medidas corporais

Respondido em 30/09/2025

Peso	60 kg
Altura	1,53 m
IMC	25,6

Medicamentos

Respondido em 30/09/2025

- ☐ Nenhum
- ☒ Clenil
- ☒ Diovan
- ☒ Puran
- ☒ Edistride
- ☒ Venaflon
- ☒ Daplagliflozina
- ☒ Somalgin

Sintomas Respondido em 30/09/2025


- ☐ Nenhum
- ☒ Ronco alto e frequente
- ☒ Sonolência excessiva diurna
- ☒ Sono não reparador
- ☐ Despertares frequentes
- ☒ Engasgos noturnos
- ☒ Refluxo gastroesofágico
- ☒ Cefaleia matinal
- ☐ Dificuldade de concentração
- ☐ Perda de memória
- ☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas Respondido em 30/09/2025

- ☐ Nenhuma
- ☒ Hipertensão arterial
- ☒ Diabetes
- ☒ Dislipidemia
- ☐ Câncer
- ☐ Depressão
- ☐ Arritmia cardíaca
- ☐ Infarto agudo do miocárdio
- ☐ Angina
- ☐ Insuficiência cardíaca
- ☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
- ☐ Bronquite / Enfisema
- ☐ Asma

Oximetria (SpO₂)

Histograma SpO₂ (%)




SpO ₂ mínima	85%
SpO ₂ média	92%
SpO ₂ máxima	97%
Tempo com SpO ₂ < 90%	41,0 min (12%)
Número de dessaturações ¹	19
Índice de dessaturações de oxigênio (IDO) ^{1,2}	3,4 /hora
Índice de dessat. de oxigênio sono (IDOs)	3,9 /hora
Carga hipóxica (hypoxic burden) ⁴	30,4 %.min/hora
Número de eventos de hipoxemia ³	0
Tempo total em hipoxemia ³	0,0 min (0%)

Análise de ronco

Tempo de gravação	349,0 min
Tempo com ronco total	3,5 min (1%)
Tempo com ronco baixo	0,0 min (0%)
Tempo com ronco médio	0,0 min (0%)
Tempo com ronco alto	3,5 min (1%)

Frequência cardíaca

Histograma frequência cardíaca (bpm)



Mínima	48 bpm
Média	77 bpm
Máxima	115 bpm

Fibrilação atrial (FA) estimada^{5,6,7}

Número de episódios	1
Tempo total em FA	344,2 min
Episódio de menor duração	344,2 min
Episódio de maior duração	344,2 min
Duração média dos episódios	344,2 min
Risco de FA	Alto

Sono estimado

Tempo total de sono	244,0 min
Tempo para dormir	57,5 min
Tempo acordado pós-sono	47,0 min
Eficiência do sono	70%

Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).
2. O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
3. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.
4. A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).
5. O risco de fibrilação atrial (FA) é estimado de forma indireta através da variação da onda de pulso do oxímetro.
6. O diagnóstico de FA e de outras arritmias cardíacas podem ser episódicos e variar noite a noite e deve ser confirmado por outras metodologias a critério médico.
7. A detecção de FA deste exame é realizada em pacientes maiores de 18 anos e considera apenas episódios com duração maior que 6 minutos. Possíveis episódios de FA com duração menor que 6 minutos não foram incluídos na análise.

Polissonografia de noite inteira (inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix® Pro

Exame

Nome	Maria Madalena Sepolini de Godoy	Nascimento	13/05/1947 (78 anos)	Sexo	Feminino
Início	07/10/2025 - 00:00:52	Tempo total	05:50:52 (350,9 min)		

Polissonogramas

