

OTNIEL PEREIRA	
HD:	APNEIA DO SONO
MEDICO:	
MEDICAMENTOS:	
IMC	
CIRCUNF. DE PESCOÇO	
PA:	
OXIMETRIA:	

P= 12.7 | IAH= 2.9/h

m. de uso: 1:36'

10/06 ~~pce~~ não esta utilizando.
21

Nome: OTNIEL PEREIRA
Data de Nascimento: 8-10-1970
IMC: 40,96
Sexo: Masculino
Data do exame: 03-02-2021

Peso: 124 kg
Altura: 1,74 m
Médico: DR. BRUNO NOGUEIRA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 03-02-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 476,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 51,5 e 109,5 minutos. O tempo total de sono foi de 358,0, eficiência de 75,1% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,8%; estágio N2: 60,3%; estágio N3: 13,1%; sono REM: 23,7%. O índice de despertares foi de 20,1/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 36,0/hora, sendo elas 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 215 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e mínima de 78%, permanecendo 4,6% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 42 - 72 bpm e NREM de 40 - 70 bpm.


CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (9), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 36,0/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=78%);
5. latência para o sono aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (3,7/hora);
8. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57