

INDICADO POR:

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

PATRICIA MAURA DE SIQUEIRA CAMPOS PIRES

IDADE: 57 PESO: 90 ALTURA: 1,54 PROFISSÃO: Escrivão Judiciário

SINTOMAS: Falta de energia; Dorco.

QUEIXAS: Sonolência diurna; Atorção cansada; Déficit concentraçf.

MEDICAMENTOS: Lixapira (Depressão); Rexute (TDAH); Dexilant (Refluxo) Colerivel

MÉDICO: Dr. Eduardo Costa / Dr. Bruno

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: musculação 2x sem / aula dança

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 23h30' - 00h HORA QUE ACORDA: 07h30' - 08h

COCHILHO (X) S () N DORME ACOMPANHADO: ☒ S ☒ N () EVENTUALMENTETEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S (X) X NA SEMANA () N Esporádico

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO/NOITE: 1x.

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: MALLAMPATI: III IAH: 49,9elh SPO2: 83%.

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: A Bronquite (crises esporádicas 1x/Ano)

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: -

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

27/01/2025 Avaliação.

Relata que está saindo do lugar a máscara, porém por seu melhora na duração

P = 8,6 (med) - 10,3 (perc)

IAH = 1,6

Fuga = 10,3

m. de uso = 6h20'

Jua.

18/02/25 P = 8,7 cmH2O

IAH = 2,1elh

m de uso: 5h54l

Fuga: 17,7l/m

fixo P = 8,4 cmH2O

Relata ainda apresentar dor de cabeça ao acordar

Natasha

11/03/25 $P=7,6 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH=4,9 \text{ e/h}$
 $m \text{ de uso: } 5 \text{ h } 18'$
 $\text{fuga: } 9,6 \text{ l/m}$

Relata ainda acordar
indisposta e sonolenta

Natasha

15/04
25 $P=7 \text{ cmH}_2\text{O}$
~~IAH~~ linical: $4 \text{ cmH}_2\text{O}$

Natasha

09/05
25 $P=4$ - $7 \text{ cmH}_2\text{O}$
ajusto o CPAP em P fixa
ajusto a mase.

Jane

16/07
25 $P=7 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $m. \text{ de uso: } 6 \text{ h}$
 $IAH=2,0 \text{ e/h}$
 $\text{fuga: } 0,6 \text{ e/h}$

TROQUEI O CPAP
Pelo Auto.

Jane



Sleep Study Report

Nome do Paciente: Patricia Maura S. Campos Pires
Nome do Médico: Eduardo R. B. Costa
Data do Estudo: 22/03/2024

Prezado Patricia Maura S. Campos Pires,

Agradecemos por ter se submetido ao estudo do sono de noite inteira com a Tecnologia PAT. Agora vamos apresentar abaixo os dados obtidos do seu exame.

Seu tempo total de estudo (que é calculado do horário que você ligou o equipamento até você retirá-lo do braço) foi de 7 hrs, 23 min. Mas como estamos avaliando para Apnéia Obstrutiva do Sono estamos interessados no tempo que você ficou dormindo. Seu tempo total de sono foi de 6 hrs, 3 min. Em média, uma pessoa com hábitos de sono normais dorme de 6 a 8 horas por noite.

Observando seus dados do sono podemos obter algumas informações importantes:

Seu Índice de Apnéia/Hipopnéia (abreviado como AHI—apnea/hypopnea index) foi de 49,9. Esse valor é o número médio de eventos de apnéia e hipopnéia por hora de sono durante a noite. Evento de apnéia é um episódio de oclusão total da respiração por mais de 10 segundos, e um evento de hipopnéia é um episódio de oclusão parcial. O valor normal do AHI é de 5 ou menos.

O seu Índice de Distúrbio Respiratório (RDI) foi de 50,9. Esse valor é calculado de uma forma muito similar ao AHI mas adicionando um tipo de evento respiratório chamado RERA que também é contado. O RERA é a abreviação de Respiratory Effort Related Arousal – Despertares Relacionados ao Esforço Respiratório – que é essencialmente um pequeno despertar de poucos segundos em seguida de uma oclusão parcial das vias aéreas. O valor normal do RDI é também de 5 ou menos.

O seu Índice de Desaturação de Oxigênio (ODI) foi de 29,2. O Esse valor é o número médio de vezes que o Oxigênio no seu sangue cai 4% ou mais durante uma hora de sono. Como pode imaginar, quanto mais o Oxigênio cai mais forte o coração tem que trabalhar. O valor normal do ODI é 5 ou menor.

Analisando seu estágio de sono REM (Rapid Eye Movement – movimento rápido dos olhos) verificamos que você esteve nesse estágio 20,2% do seu tempo de sono. O Sono REM é muito importante porque durante esse estágio seu corpo está sendo reabastecido e nutrido. O valor normal para o REM é entre 15 e 30% dependendo de outras condições. Também acredita-se que é durante o estágio REM que sonhamos.

Se precisar de mais esclarecimentos, estaremos à disposição.

Atenciosamente,

Dra. Andreza Chaguri
Clínica Médica/ Cardiologia
CRM 196.831

Rev 29

Printed on: 22/03/2024