

* Por cultura

☐ ACOMPANHAMENTO		☒ CONSULTA	
NS			
JOSE ANTONIO DOS SANTOS			
IDADE: 65	PESO: 92	ALTURA: 1,77	PROFISSÃO: Engenheiro
SINTOMAS: Sonolência - edema leve de mm II.			
QUEIXAS: Ronco			
MEDICAMENTOS: afilax / acetaminofeno			
MÉDICO: Dr. Márcio Sérgio - Dr.º Keffell			
MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N			
EXERCÍCIO FÍSICO: corrida			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 8h ALMOÇO: 12:30 LANCHE: 16h JANTAR: 21h			
HORA QUE DORME: 8h manhã		HORA QUE ACORDA: 7h ±	
COCHILHO (X) SIM () NÃO		DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA (X) SIM () NÃO NA SEMANA () NÃO eventual			
FUMO () SIM () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: ± 20 anos			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal		BANHEIRO: 1X	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: não	MALLAMPATI: III	IAH: 26,8	SPO2: 77% mínima
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: HAS - Sinusite			
CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA não			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA (S) CARDÍACA			
(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS Dores nos joelhos (de dia) fua.			
26/08 Avaliação - Irá lavar.			
24			
16/09	P = 8cm H ₂ O	Bem adaptado relatou	
24	IAH = 1,4 e/ev	estar dormindo tarde.	
	m. de uso: 4h 26'	fua.	
	fuga = 5,5 e/ev		
Fazer relatório p/ Dr.º Keffell.			
07/10	P = 8cm H ₂ O	anda cf leve sonolência	
24	IAH = 1,9 e/ev	eio	
	m. de uso: 4h 30'	fua.	
	fuga = 3,3 e/ev		
11/11	P = 8cm H ₂ O		
24	IAH = 1,4 e/ev		
	m. de uso: 4h 26'		
	fuga: 4,3 e/ev	Natacha	
13/01/25	P = 8cm H ₂ O	Regulei o CPAP Philips	
	IAH = 1,2 e/ev	que ele comprou	
	m. de uso: 4h 12'	fua.	
	Quanto qto ao uso.		

29/04/25 P=8 cmH₂O
IAH = 2,3 e/h
mduro: 2h54'

Pte relata que dorme
antes de colocar a
máscara.

Oriento aumento horas
de uso do CPAP

Natasha

30/06
25

P=8,0 cmH₂O
IAH = 3,4 e/h
M. de uso: 4h 14'
fuga = 20"

Bem adapt., relata que ~~in~~ este
colocando após voltar do
banheiro. ~~fora~~.

Paciente: **JOSE ANTONIO DOS SANTOS** (65 anos)

Convênio: **Unimed**

Matrícula: **00045500065008640**

Relatorio medico.

*Paciente com indicação de uso de cpap na pressão titulada de 8,0
cm de H2O*

Necessita ajuste fino da pressão

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
Otorrinolaringologista
CRM 57250

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
CRM 57250

Nome: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS

Data de Nascimento: 5-1-1959

IMC: 29,37

Sexo: Masculino

Data do exame: 29-02-2024

Peso: 92 kg

Altura: 1,77 m

Médico: DR. MARIO SERGIO LEONE

CARREGOSA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 29-02-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 460,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 2,5 e 165,0 minutos. O tempo total de sono foi de 344,5 min, eficiência de 74,9% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,9%; estágio N2: 50,4%; estágio N3: 23,7%; sono REM: 24,1%. O índice de despertares foi de 15,1/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 26,8/hora, sendo 55 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 99 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e a mínima de 77%, permanecendo 10,4% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 44 - 65 bpm e NREM de 44 - 74 bpm.


CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (10), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N3 do sono NREM normal;
3. latência para o sono REM aumentada;
4. aumento do número de despertares breves;
5. presença de atividade em EMG de queixo;
6. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (3,3/hora);
7. registro de ronco durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 8,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57