

Exame

Nome	Claudinei Moreira De Oliveira	Nascimento	11/03/1945 (81 anos)	Sexo	Masculino
Início	29/03/2026 – 23:14:41	Tempo total	06:40:58 (401,0 min)		
Fim	30/03/2026 – 05:55:39	Tempo válido	06:35:28 (395,5 min)		

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☐ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☒ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Ficha médica

Medidas corporais

Respondido em 13/12/2024

Peso 77 kg
Altura 1,76 m
IMC 24,9

Medicamentos

Não respondido

- ☐ Nenhum


Sintomas Respondido em 13/12/2024

- ☐ Nenhum
- ☒ Ronco alto e frequente
- ☐ Sonolência excessiva diurna
- ☐ Sono não reparador
- ☒ Despertares frequentes
- ☐ Engasgos noturnos
- ☐ Refluxo gastroesofágico
- ☐ Cefaleia matinal
- ☐ Dificuldade de concentração
- ☐ Perda de memória
- ☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas Não respondido

- ☐ Nenhuma
- ☐ Hipertensão arterial
- ☐ Diabetes
- ☐ Dislipidemia
- ☐ Câncer
- ☐ Depressão
- ☐ Arritmia cardíaca
- ☐ Infarto agudo do miocárdio
- ☐ Angina
- ☐ Insuficiência cardíaca
- ☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
- ☐ Bronquite / Enfisema
- ☐ Asma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)

IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia com polissonogramas realizado no dia 29/03/2026, iniciado às 23:14 e terminado às 05:55. O tempo total de registro foi de 6h40min (400 minutos) e o tempo válido foi de 6h35min (395 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 5 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 0,8/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 96% e não permaneceu abaixo de 90% por tempo significativo. Não foram detectados eventos de ronco durante o registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame normal (IDO 0,8/hora), nas condições descritas e com o uso de CPAP.


Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1


Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).
2. O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
3. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.
4. A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).


Exame

Nome	Claudinei Moreira De Oliveira	Nascimento	11/03/1945 (81 anos)	Sexo	Masculino
Início	29/03/2026 - 23:14:41	Tempo total	06:40:58 (401,0 min)		

Oximetria (SpO₂)



Frequência cardíaca




Sono estimado

Tempo total de sono	320,0 min
Tempo para dormir	30,0 min
Tempo acordado pós-sono	45,0 min
Eficiência do sono	80%


Carga hipóxica - Hypoxic burden

Carga hipóxica⁴ 1,2 %.min /hora



Análise de ronco

Tempo de gravação	401,0 min
Tempo com ronco	0,0 min (0%)



Polissonogramas

