

TEREZINHA LEITE			
MEDICAMENTOS:			
SINTOMAS/QUEIXAS		Sonolência	
BANHEIRO			
HORA QUE ACORDA		7:00	
HORA QUE DORME		22:30	
		N	
PRATICA EXERCICIO		Não	
HORARIO DAS REFEIÇÕES			
CAFE:	ALMOÇO:	LANCHE:	JANTA:
20/05	P = 13 cmH ₂ O	(CPAP elite)	
22	IAH = 3.1		
M. de uso: 6h			
Bem adaptada, ouento a nutriçomto			
fua			
08/06	P = 13 cmH ₂ O		
22	IAH = 2.9 l/h		
M. de uso: 4h44			
fua			
22/06	P = 13 cmH ₂ O		
22	IAH = 2.1 l/h		
Fuga = 23.0 l/min			
fua			
06/07	P = 13		
22	IAH = 0.3		
M. de uso: 6h 10'			
fua			
07/11	P = 13 cmH ₂ O	Bem adaptada, relata	
22	IAH = 2.9 l/h	estar com crise de asma	
M. de uso: 5h44'			
fua			
07/12	P = 13 cmH ₂ O	Bem adaptada,	
22	IAH = 3.9 l/h		
M. de uso: 5h49'			
30/01	P = 13 cmH ₂ O		
23	IAH = 3.7 l/h	Bem adaptada.	
M. de uso: 5h35'			
Fuga = 23.8 l/min			
TECOO FILTRO			
fua			
27/03	P = 13 cmH ₂ O		
23	IAH = 6.5 l/h		
M. de uso: 4h51'			
Fuga = 25.4 l/min.			
Relata refluxo gastro			
fua			

06/06
23 P= 13cmH₂O
IAH= 3.1 e/h
m. de uso: 6h15'
Bem adaptada s/ queixas.

fua

08/08
23 P= 13cmH₂O
IAH= 5.3 e/h
m. de uso= 4h40'
Fuga= 33.6 l/min.

está c/ infecção urinária e um
TV no rim (E), fará cirurgia.

fua

24/10/23 P= 13cmH₂O
IAH= 4.3 e/h.
m de uso= 5h30'
fuga= 34 l/min

- retirada Rim E há 1 mês.
- Bem adaptada

17/01
24 P= 13cmH₂O
IAH= 1.3 e/h
M. de uso: 5hr

Bem adaptada.

fua cláudio

21/03
24 P= 13cmH₂O
IAH= 2.6 e/h
m. de uso: 5hr
Fuga= 39.3 lpm.

Bem adaptada.

06/06
24 P= 13cmH₂O
IAH= 1.6 e/h
m. de uso: 5h51'
fuga= 34.5

Bem adapt., relata estar dormindo bem

fua.

05/09
24 P= 13cmH₂O
IAH= 2.7 e/h
m de uso: 5h35'
fuga: 36.6 l/m

Bem adaptada

Realiza fisioterapia
3x semana

Natasha

07/11/24 P= 13cmH₂O
IAH= 3.5 e/h
m de uso: 4h7'
fuga: 36 l/m

Está em crise ematológica
e passou período c/
dor na coluna

Natasha

06/02/24 P= 13cmH₂O
IAH= 4.7 e/h
m de uso: 4h46'
fuga: 35.6 l/m

Dor na coluna, retira
a manara a
noite

Natasha

1/25 P= 13 cm H₂O
IAH= 4,2 cm/h
m. de uso: 4 h 29'
fuga: 367 l/m

Relata período c/
pneumonia porém já
tratada

Natasha

04/07 P= 13 cm H₂O
IAH= 2,6 cm/h
m. de uso: 6h 23'
fuga= 35

Bem adapt. porém escape
de ar importante. - fua

Obs a masc. pois estava c/ qde fuga, possível
troca.

Carolina Ruston
Otorrinolaringologista
CRM 94.279

Título de Especialista pela Sociedade
Brasileira de Otorrinolaringologia


Paciente: **TEREZINHA LEITE**

Encaminho esta paciente para colega Fisioterapeuta Ana Cláudia.

Indicação:

Paciente com quadro de SAHOS de grau acentuado e necessita do uso de CPAP, mas como é hipertensa e cardiopata pedi a Polissonografia com CPAP, mas já te encaminho para avaliação.
Att

Jacareí, 11 de abril de 2022


Dra. Carolina Ruston
Otorrinolaringologista
CRM 94279 / RQE 70232

Dra. Carolina Ruston Daher
CRM 94279

Tel: (12) 3951-3854 - ☎ (12) 99719-2329

Rua Tiradentes, 299 - Centro - 10º andar - Sala 1012 - CEP 12308-470 - Jacareí - SP

Rua Pompílio Mercadante, 398 - Centro - 10º andar - Sala 1012 - CEP 12308-510 - Jacareí - SP

Nome: TEREZINHA LEITE

Data de Nascimento: 31-3-1954

IMC: 35,38

Sexo: Feminino

Data do exame: 30-04-2022

Peso: 94 kg

Altura: 1,63 m

Médico: DRA. CAROLINA RUSTON DAHER

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 30-04-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 498,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 53,0 e 110,0 minutos. O tempo total de sono foi de 289,0, eficiência de 58,0% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,6%; estágio N2: 54,8%; estágio N3: 22,7%; sono REM: 19,9%. O índice de despertares foi de 8,7/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 23,7/hora, sendo elas 13 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 101 hipopnéias. A SpO2 média foi de 87% e mínima de 60%, permanecendo 48,8% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 46 - 72 bpm e NREM de 45 - 59 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (09), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem dos estágios do sono NREM dentro da normalidade;
3. latência para o sono aumentada;
4. número de despertares breves normal;
5. registro de ronco moderado durante o sono.


Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 13,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.57

Nome: TEREZINHA LEITE
Data de Nascimento: 31-3-1954
IMC: 35,38
Sexo: Feminino
Data do exame: 18-03-2022

Peso: 94 kg
Altura: 1,63 m
Médico: DRA. CAROLINA RUSTON DAHER
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 18-03-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 531,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 50,5 e 213,0 minutos. O tempo total de sono foi de 390,0, eficiência de 73,4% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,2%; estágio N2: 70,3%; estágio N3: 6,7%; sono REM: 20,9%. O índice de despertares foi de 36,5/hora (normal < 10/h).

O índice de apnéia/hipopnéia total foi de 69,2/hora, sendo elas 11 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 416 hipopnéias. A SpO2 média foi de 85% e mínima de 59%, permanecendo 62,6% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 51 - 74 bpm e NREM de 49 - 77 bpm.


CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (09), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 69,2/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=59%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157