

Exame

Nome	ROBIM NORIHITO FURUKITA	Nascimento	23/09/1964 (61 anos)	Sexo	Masculino
Início	26/11/2025 - 02:35:00	Tempo total	04:28:38 (268,6 min)		
Fim	26/11/2025 - 07:03:38	Tempo válido	04:21:50 (261,8 min)		

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☐ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☐ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Ficha médica

Medidas corporais

Respondido em 10/07/2025

Peso 75 kg
Altura 1,78 m
IMC 23,7

Medicamentos

Respondido em 10/07/2025

- ☐ Nenhum
- ☒ Glifage 500mg
- ☒ Rovustatina Calcica 20


Sintomas Respondido em 10/07/2025

- ☐ Nenhum
- ☒ Ronco alto e frequente
- ☐ Sonolência excessiva diurna
- ☐ Sono não reparador
- ☐ Despertares frequentes
- ☐ Engasgos noturnos
- ☐ Refluxo gastroesofágico
- ☐ Cefaleia matinal
- ☐ Dificuldade de concentração
- ☐ Perda de memória
- ☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas Respondido em 10/07/2025

- ☐ Nenhuma
- ☒ Hipertensão arterial
- ☐ Diabetes
- ☐ Dislipidemia
- ☐ Câncer
- ☐ Depressão
- ☐ Arritmia cardíaca
- ☐ Infarto agudo do miocárdio
- ☐ Angina
- ☐ Insuficiência cardíaca
- ☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
- ☐ Bronquite / Enfisema
- ☐ Asma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)

IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia realizado no dia 26/11/2025, iniciado às 02:35 e terminado às 07:03. O tempo total de registro foi de 4h28min (268 minutos) e o tempo válido foi de 4h21min (261 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 98 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 22,5/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 94% e permaneceu abaixo de 90% durante 2% do tempo de registro (7 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 21% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono moderada (IDO 22,5/hora), nas condições descritas.

Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1


Notas:

- Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).
- O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
- Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.
- A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).


Exame

Nome	ROBIM NORIHITO FURUKITA	Nascimento	23/09/1964 (61 anos)	Sexo	Masculino
Início	26/11/2025 - 02:35:00	Tempo total	04:28:38 (268,6 min)		

Oximetria (SpO₂)



Frequência cardíaca



Sono estimado

Tempo total de sono	222,0 min
Tempo para dormir	24,5 min
Tempo acordado pós-sono	20,0 min
Eficiência do sono	83%


Carga hipóxica - Hypoxic burden

Carga hipóxica⁴ **68,1 %min /hora**



Análise de ronco

Tempo de gravação	267,0 min
Tempo com ronco	56,1 min (21%)



Polissonogramas

