

JOSE ANTONIO FERREIRA	
HD:	APNEIA DO SONO
MEDICO:	Dr.º Perolva
MEDICAMENTOS:	
IMC	
CIRCUNF. DE PESCOÇO	Faz uso de Zopidem
PA:	
OXIMETRIA:	
19/06	Sem dados no cartão
21	Treco a máscara p/ oxif. — Jua
21/06	P = 5-15 cmH ₂ O
21	Sem dados no cartão. ajusto máscara — Jua
26/07	aguardando um sleep.
02/08	5-15 $\Rightarrow$ 12.9
21	IAH 9.9 Jua
13/08	5-15 $\Rightarrow$ 12.1 Comprou S10 auto.
21	m. de uso: 14' IAH = 12.8 $\leftarrow$ A = 12.4 P = 0A Jua
25/08	11 max. / min. 5
21	m. de uso: 14' IAH = 18.9 $\leftarrow$ A = 18.4 H = 0.5 Jua
11/10	P = 5-14 max.
21	m. de uso: 1hr IAH = 19 Jua
19/12	P = 5-9.8 cmH ₂ O
21	m. de uso: 9.41 IAH = 9.7
18/01	P = 5-10 (média 9.3 cmH ₂ O)
22	m. de uso: 1hr 20' IAH = 10.7 (A. central 8.7/hr)

28/03 $P = 9.0$ (percentil)
22 $IAH = 11.2 / h$ ($IC = 9.6$)
M. de uso: 6h30 fua

12/05 $P = 8.8$ (Percentil) 5 - 8.8 cmH₂O
22 $IAH = 8.9 / h$
M. de uso: 6h fua
Bem adapt., deixou aquecimento ligado

20/06 $P = 8.8$ cmH₂O
22 $IAH = 12.7$ el/min
M. de uso: 4h30 fua
Colocar capta no traqueia

05/07 $P = 8.8$
22 $IAH = 12.7$ el/min
M. de uso: 5h30' fua

A o traqueia

25/07 $P = 8.3$ cmH₂O
22 $IAH = 13.8 / h$ $IA = 12.9 / h$ $IH = 0.7 / h$
M. de uso: 7h27' fua

Retirado

24/08 $P = 8.6$
22 $IAH = 10.7 / h$
M. de uso: 6h28' fua

13/09 $P = 8.6$ ($P_i = 6.0$ cmH₂O)
22 $IAH = 12.5 / h$
M. de uso: 5h46' fua

30/09 $P = 8.1$ cmH₂O
23 $IAH = 7.5$ el/h
M. de uso: 5h33' fua
Zopidem 5mg / melatonina
pente mau
estar.

24/04 $P = 8.6$ cmH₂O
23 $IAH = 7.4$ el/h
M. de uso: 7h13'
Bem adaptada, uso Zopidem (2x 5mg)
ajuste a marcapasso. fua

01/06 $P = 5$ a 8.6 cmH₂O mediana 6 cmH₂O / percentil 8 cmH₂O
23 $IAH = 7.5$ el/h
M. de uso: 6h50' fua
ficou 50 dias s/ usar pq mãe anterior usou (mto)
(ficou 50 dias s/ usar pq mãe anterior usou mto)

31/07/23 P: 5 a 7 cmH₂O mediana 6 cmH₂O Percentil 6.9 cmH₂O
IAH = 9.2 e/h (C: 6.6 Out: 1.6 Hpo: 1.0)
m. de uso: 7h 26' min ↑ P: 5 a 7.6 cmH₂O.
fuga: 15 l/min

19/12/23 P: 6.5 - 7.5
m. de utiliz. - Ph
IAH = 13.1 (IAC = 10 e/h). Fua

24/02/24 P: 5 - 7.6 cmH₂O
m. de uso: 4h 57m
IAH = 14.8 (IAC: 11.2) Natasha

24/04/24 P: 6 cmH₂O
m. de uso: 7h 20'
IAH = 14.3 e/h
~~m. de uso: 7h 20'~~ fuga = 0.0 Fua.

15/07/24 P: 7.6 cmH₂O / Fuga = 0.0
AO = 2.4 e/h - IAH = 11.7 e/h ⇒ IAH = 11.7 e/h
- Relator que esta tendo arritmia (ablação)
- Bem adapt. Fua.

02/09/24 P: 6.7 P95%: 7.5 cmH₂O Fez Ablação 08/08/24
IAH = 11.3 (AO: 1.8 Ac: 8.2)
m. de uso: 5h 55 min. Auto 5 a 7.5 cmH₂O.
fuga: 7 l/min. * houve mais Dream Wear Pillow*
(1)

07/11/24 P: 7.6 cmH₂O Fez a ablação.
IAH = 12.1 e/h
m. de uso: 4h 56'
fuga = 4.7 cmH₂O Fua

30/05/25 P: media: 6.7 cmH₂O Relata a máscara
esta pegando no rosto
IAH = 12.6 e/h Ajuste e Oxiato
m. de uso: 4h 37' Natasha
fuga: 0

30/06/25 Houve 4 de peso e retenção de líquido
P: 7.4
IAH = 15.0 (AC = 11.7) (AO = 2.0) Hip = 1.2
m. de uso: 5h 20'

Nome: JOSÉ ANTONIO FERREIRA
Data de Nascimento: 20-7-1948
IMC: 26,20
Sexo: Masculino
Data do exame: 07-05-2021

Peso: 83 kg
Altura: 1,78 m
Medico: DR. PERALVA DELGADO JÚNIOR
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 07-05-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 482,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 57,5 e 350,0 minutos. O tempo total de sono foi de 135,5, eficiência de 28,1% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,0%; estágio N2: 60,1%; estágio N3: 21,8%; sono REM: 15,1%. O índice de despertares foi de 7,1/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 27,9/hora, sendo elas 1 obstrutiva, 0 mistas e 0 centrais e 28 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e mínima de 88%, permanecendo 0,6% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 40 - 65 bpm e NREM de 43 - 58 bpm.


CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (07), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 27,9/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=88%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. número de despertares breves normal;
7. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

