

in ka ro hiper

DR ALBERTO REMESAR

YUKIKO AGUINA			
MEDICAMENTOS:	Micardol / Glifase / Aropuilon / Requinol		
SINTOMAS/QUEIXAS	Dorax / Puran / Inrelat / antaro / EP		
BANHEIRO	2X		
HORA QUE ACORDA	6:20		
HORA QUE DORME	00:00 (cacha-a noite) antes		
SONECA DURANTE O DIA	nao		
PRATICA EXERCICIO	nao (orientei 2x por		
HORARIO DAS REFEIÇÕES			
CAFE:	6:30	ALMOÇO:	11:30 LANCHE: JANTA: 16:30 - 17m
25/04/22 - IAH = 81.2/h - SpO2 89% Eficiência Sono 65.5% Teme mau subito 2x, convulsão.			
29/04/22 P = 9.0 IAH = 0.4 M. de uso: 6h			
20/05/22 P = 8.0 IAH = 2.2/h Fuga: 44.1/min M. de uso: 1h Oriento sobre a frequência - fua			
24/06/22 P = 8.0 IAH = 1.3 M. de uso: 3h30' Fuga = 26.3 fua			
14/07/23 P = 8.0 IAH = 0.6 Fuga 26.5 M. de uso: 0:40 fua			
07/10 22 P = 8.0 cm40 IAH = 0.8/h M. de uso: 36.7 l/min Bem adaptado abnido a boca fua Fua 1 dias intermido			
12/06 23 P = 7.2 cm40 IAH = 0.4 e per M. de uso: 4h Boca seca Pressão alta.			
09/08/23 in esta usando f: 4 a 7 cm40			

23/08/23	P = 6,7 cmH ₂ O IAH = 0,9 e/h fuga = 16 l/min. m. de uso = 6 horas	→ usou 13 dias / 14. B melhor disposta
02/10/23	P = 6,3 cmH ₂ O IAH = IAH 1,0 e/h m. de uso = 6 horas fuga = 11 l/min	PQS: 6,9 cmH ₂ O 4 a 7 cmH ₂ O * Bem disposta novo filtro.
04/12/23	P = 5,8 IAH = 0,8 m. de uso: 5h 23'	fua.
29/01/24	P = 5,4 cmH ₂ O IAH = 0,6 e/h m. de uso: 5h 45'	fua
01/04/24	P = 5,3 cmH ₂ O IAH = 0,7 e/h m. de uso: 6 hr.	Boca seca, durante o sono. fua.
01/07/24	P = 6,3 cmH ₂ O IAH = 1,1 e/h m. de uso: 6 hr. Fuga = 0,1 lpm.	fua.
02/09/24	P = 4-7 cmH ₂ O / med: 5,7 cmH ₂ O IAH = 0,5 e/h m. de uso: 5h 25' fuga: 0,2 lpm	traco filtro Natasha
11/11/24	P = 5,7 cmH ₂ O IAH = 0,7 e/h m. de uso: 6h 19' fuga: 0	Traco filtro Bem adaptada Natasha
24/02/25	P = 6,0 cmH ₂ O IAH = 0,5 e/h fuga = 90 m. de uso = 6h 32'	fua claudia
15/06	P = 6,0 IAH = 0,5	traco Bojo / Traguinho e filtro fua

Silveira
serviços médicos

www.silveirasjc.med.br

R: Prof Alfredo Vieira de Moura, 85

Vila Adyana- São José dos Campos-SP

CEP: 12243-770 - contato@silveirasjc.med.br

Tels: (12) 3922-6109 / 3917-9828 / 98866-6109 

Yukiko Aguina

À EMPRESA DE CPAP

**PACIENTE COM APNÉIA DO SONO, SEM MELHORA COM
TRATAMENTO CLÍNICO**

**POLISSONO
EFICIÊNCIA - 65,5%
IAH - 81,2/H
SAT BASAL - 89%
NADIR - 78%
4% DE SONO REM**

**SOLICITO ADAPTAÇÃO PARA CPAP, EM RAMPA,
AUTOMÁTICO, COM UMIDIFICADOR**

GRATA,

Dr. Luiz Antonio da Silveira
Clínica Médica
CRM - 40.263 - RQE: 38744

Dra. Marina Leite da Silveira
Dermatologista
CRM 130.637 / RQE: 36404

Dr. Mateus Francisco S. Libardi
Ortopedia e Traumatologia
Especialista em Joelho
CRM - 143.110 / TEOT: 13337
RQE: 49194

Dra. Priscila Leite da Silveira
Otorrinolaringologista
CRM - 140.497 / RQE: 40311

Dra. Priscila L. Silveira
Otorrinolaringologista
CRM 140.497



clínica
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO
PSIQUIATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
CRM-SP: 69.730

DR. ELITÂNIA MARINHO
CRM-SP: 62.858

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Yukiko Aguina

EXAME nº: 5073

SOLICITADO POR: Dr. Oswaldo Couto Júnior

DATA: 03/03/2022

IDADE: 74 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h54min e concluído às 05h47min. A latência para o sono foi de 13 minutos e a latência para o estágio REM, de 351 minutos. O tempo total de sono foi de 261 minutos (04h21min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 65,5%. A distribuição do sono mostrou 36,6% de estágio 1, 50,2% de estágio 2, 9,2% de estágio 3 e 4% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 124,5 minutos em vigília, ocorreram 188 microdespertares (índice: 43,2/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0,7/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 81,2/hora, sendo 7,6 apneia/hora e 73,6 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 81,2/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 89%, sendo a saturação média de 92% e a mínima de 78%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (81,2/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (81,2/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, ritmo cardíaco sinusal e despertares. As frequências cardíacas foram: mínima: 58; máxima: 81 bpm.

O ronco foi contínuo e baixo.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 13 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (351 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 65,5%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 43,2/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento da porcentagem do estágio 1 (36,6%; normal: 8-10%) e a redução dos estágios 3 (9,2%; normal: 10-12%) e REM (4%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (50,2%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade.

O índice de movimentos periódicos de membros (0,7/hora; índice normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade.

Escala de Sonolência de Epworth: 17 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730