

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| LUZIA GODOY MONTEIRO DA COSTA |                 |
| HD:                           | AOS             |
| MEDICO:                       | Mario Regina    |
| MEDICAMENTOS:                 |                 |
| IMC                           | 24.65           |
| CIRCUNF. DE PESCOÇO           | IAH = 27.3 e/lv |
| PA:                           |                 |
| OXIMETRIA:                    | 65 min.         |

27/09 P. automática 4 - 13 cmH<sub>2</sub>O  
 21 Titulação

01 M. 43'  
 10 Fuga: 34.8  
 21 IAH = 6.1

Colocar esparadrapo na boca — Fua

08/10 P = 11.1  
 21 Fuga: 30.8  
 IAH: 3.6

Fua

26/10 P = 11.3  
 21 Fuga: 40.7  
 IAH = 1.9

Bem adapt., porém com fuga pela boca,  
 oriento micropore Fua

26/11 P = 10.8  
 21 Fuga: 33.9  
 IAH = 1.6

Bem adaptado

Fua

15/12 P = 10.2  
 21 Fuga: 32.4  
 M. de uso: 6h37'

Fua

11  
 22 P = 9.7 IAH = 0.8 l/min

22 Fuga: 32.8 l/min  
 M. de uso: 6h30'

Fua

09/03  
22  $P = 9.9 \text{ cmH}_2\text{O}$   
 $m. \text{ de uso: } 5 \text{ h } 40'$   
 $IAH = 0.7/\text{ev}$   
 $Fuga = 24.4 \text{ l/min.}$

fua

09/05  
22  $P = 9.9 \text{ cmH}_2\text{O}$   
 $IAH = 0.7/\text{ev}$   
 $Fuga = 20.8 \text{ l/min}$   
Troco filtro

fua

28/07  
22  $P = 9.8 \text{ cmH}_2\text{O}$   
 $IAH = 1.2/\text{ev}$   
 $m. \text{ de uso: } 7 \text{ h } 27'$   
Bem adaptado

fua

23/09  
22  $P = 9.8 \text{ cmH}_2\text{O}$   
 $IAH = 0.9/\text{ev}$   
 $m. \text{ de uso: } 8 \text{ h}$   
Bem adaptado, 4 queixas de soluçao - fua

28/11  
22  $P = 9.5 \text{ cmH}_2\text{O}$   
 $IAH = 1.5/\text{ev}$   
 $m. \text{ de uso: } 7 \text{ h } 30'$   
Bem adaptado

fua

30/01  
23  $P = 9.3 \text{ cmH}_2\text{O}$   
 $IAH = 1.4 \text{ e } 1 \text{ ev}$   
 $m. \text{ de uso: } 7 \text{ h } 50'$   
 $Fuga = 15.7 \text{ l/min.}$

Bem adapt., s/ queixas

fua

24/04  
23  $P = 8.4 \text{ cmH}_2\text{O}$  (mediana)  
 $IAH = 1.2 \text{ e } 1 \text{ ev}$

Troco o filtro  
(3 meses)  
Ret.

$m. \text{ de fuga } 1.8 \text{ (med)} - (21.3 \text{ perc})$   
 $m. \text{ de uso: } 7 \text{ h } 33' - \text{ Bem adaptada / s/ queixas}$   
fua

25/07  
23  $P = 9.8 \text{ perc} / 8.4 \text{ mediana}$   
 $m. \text{ de uso: } 7 \text{ h } 42'$   
 $IAH = 1.3 \text{ e } 1 \text{ ev}$   
 $fuga = 0.8 \text{ l/min.}$

24/10/23  $P = 8.6 \text{ cmH}_2\text{O}$   $P_{95\%} = 9.7 \text{ cmH}_2\text{O}$   
 $IAH = 1.0 \text{ e } 1 \text{ ev}$

Bem adaptada  
(Auto 5 a 40 cmH<sub>2</sub>O)

$m. \text{ de uso: } 7 \text{ h } 30'$   
 $fuga = 19.9 \text{ l/min}$

19/05  
25  $P = 7.4 \text{ cmH}_2\text{O}$   $m. \text{ de uso: } 7 \text{ h } 45'$   
 $IAH = 0.9$   
 $Fuga = 26.4 \text{ l/min.}$

fua



Nome: LÚZIA GODOY MONTEIRO DA COSTA

Data de Nascimento: 17-4-1947

IMC: 24,65

Sexo: Feminino

Data do exame: 21-08-2021

Peso: 60 kg

Altura: 1,56 m

Médico: DRA. MARIA REGINA DA JUSTA

FEIJÃO

Medicamentos:

Histórico:

### Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 21-08-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO<sub>2</sub>) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 546,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 33,5 e 156,0 minutos. O tempo total de sono foi de 413,0, eficiência de 75,6% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,5%; estágio N2: 57,3%; estágio N3: 20,8%; sono REM: 19,4%. O índice de despertares foi de 15,1/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 27,3/hora, sendo elas 1 obstrutiva, 0 mistas e 0 centrais e 185 hipopnéias. A SpO<sub>2</sub> média foi de 92% e mínima de 65%, permanecendo 4,2% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 49 - 94 bpm e NREM de 47 - 89 bpm.

**CONCLUSÃO:** Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (06), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 27,3/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (mín. SaO<sub>2</sub>=65%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco moderado durante o sono.


**Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.**

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

  
Dr. José Mario Simões da Costa  
Medicina do Sono  
CRM 57157