

WILSON ROBERTO JANUARIO ALVES

HD:

MEDICO:

MEDICAMENTOS:

IMC

CIRCUNF. DE PESCOÇO

PA:

OXIMETRIA:

12/ P = 8.2 cmHg

12/ IAH = 1.2

21 M. de uso: 4:55

18/ P = 7.8 cmHg

21 IAH = 0.6

21 M. de uso: 2h41

Orientação

fua

29/ P = 7 cmHg

21 IAH = 0.6

21 M. de uso: 3h30

Oriento inicial fono (lateral)

fua

07/ P = 6.5

12/ IAH = 0.8

21 M. de uso: 2h32

05/ P = 6.7 autom.

01/22 IAH = 0.3

22 M. de uso: 2h40'

fua

18/01 P = 7.0

22 IAH = 1.0

22 M. de uso: 3h17'

fua

02/03 P = 7.0

22 IAH = 0.9

22 M. de uso 3hs

fua

06/04 P = 7.5

22 IAH = 1.4

22 M. de uso: 2h50

fua

10/06/22 P: 7.2

IAH = 1.1

M. de uso: 2h33'

Bem adaptada, porém n° de horas
está muito baixo Jua

09/08
22

P: 6.3 cm H₂O

IAH = 0.8

M. de uso: 2h20'

Fará acomp. da Drª Jennifer — Jua

16/08
22

P: 7.6 cm H₂O

IAH = 0.9 e/v

M. de uso: 5h12'

Conseguiu se adaptar. — Jua

06/09/22

P: 7.6 cm H₂O

IAH = 1.7 e/v

M. de uso: 5h27'

— Jua

27/09
22

P: 7.4 cm H₂O

IAH = 1.0 e/v

M. de uso: 5hr ✓

Bem adaptada Jua

31/01
23

P: 7.3 cm H₂O

IAH = 0.8 e/v

M. de uso: 3h25'

Bem adaptada, pedala 3x na semana Jua

28/07
23

P: 6.5 cm H₂O

IAH = 0.7.

M. de uso: 2hr

Jua.

24/08
23

P: 6.8 cm H₂O

IAH = 1.1 e/v

M. de uso: 3hr.

Jua.

28/09
23

P: 6.6 cm H₂O

IAH = 1.1 e/v

M. de uso: 2h52'

Jua.

24/10

P: 6.6 cm H₂O

IAH = 0.9

IAH = 25.0

M. de uso: 2h26'

Jua

28/11
23

P: 7.4 cm H₂O

IAH = 0.9 e/v

M. de uso: 4h16'

15/02 P= 5.3 cmH₂O
24 IAH= 0.7 e/h
m. de uso: 3h12'

lua.

13/03 P= 8 - 4 cmH₂O
24 IAH= 1.3 e/h
m. de uso: 3h42'
Fuga= 26.5 lpm.

lua

25/04 P= 4 - 8 cmH₂O
24 m. de uso: 5h53'
IAH= 1.0 e/h

encaminhei p/ Dr. Maria Célia

04/07/24 P= 4-8 cmH₂O
IAH= 0.4 e/h

m de uso: 2h48'
fuga: 31,8 l/m

Não consegue permanecer
mais tempo c/ aparelho
chuto limpar aha
de bique p/ melhorar
fuga de ar
Natacha

20/08/24 P= 4-8 cmH₂O

IAH= 0,9 e/h

m de uso: 2h56'

fuga: 23,8 l/m

- mantém relato anterior;
- não aderiu ao medicamento
passados pela Dra Maria Célia;
- não realizou a limpeza da
bique

Natacha

19/09/24 P= 5,8 cmH₂O

IAH= 0,7 e/h

m de uso: 3h17'

fuga: 23,2 l/m

Traco ~~para~~ almofada da
marcand p/ uma swift fr
pillow

Natacha

31/10 P= 5.8 med. / Perc. 7.1 cmH₂O

24 IAH= 0,8 e/h

m. de uso: 3h10'

* houve melhora nos dias que ele utilizou
ele consegue manter 4h20' lua.

26/03/25 P= 5,8 cmH₂O

IAH= 0,6 e/h

m de uso: 3h36'

fuga: 32,2 l/m

- não se adaptou a almofada
c/ pillow

Natacha

Usou 15 dias de 24 dias
8 < 4h

Donarum (50mg)

13/06 P= 6cmH₂O
IAH= 0,9 e/h
25 m. de uso: 2h 32'
fuga= 32 e/h.

15/07/25 P= 6cmH₂O
IAH= 0,3 e/h
muro= 3h 40 min
fuga= 40 e/h min.

nao gosta de usar. - oienho / muro 27d
di 30d

hao fixador + filio

Silica

Nome: WILSON ROBERTO JANUARIO ALVES
Data de Nascimento: 10-7-1956
IMC: 27,73
Sexo: Masculino
Data do exame: 11-10-2021

Peso: 83 kg
Altura: 1,73 m
Médico: DR. MÁRIO SILVA JORGE
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 11-10-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 461,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 34,5 e 62,5 minutos. O tempo total de sono foi de 302,5, eficiência de 65,6% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 5,3%; estágio N2: 54,9%; estágio N3: 21,5%; sono REM: 18,3%. O índice de despertares foi de 14,4/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 30,1/hora, sendo elas 18 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 48 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e mínima de 83%, permanecendo 7,5% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 57 - 88 bpm e NREM de 55 - 98 bpm.


CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (11), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem dos estágios do sono NREM dentro da normalidade;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 30,1/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=83%);
5. latência para o sono aumentada e latência para o sono REM diminuída;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157