

MC sistema

CRISTIANA TOLOSA PONTES	
HD:	
MEDICO:	
MEDICAMENTOS:	
IMC	
CIRCUNF. DE PESCOÇO	
PA:	
OXIMETRIA:	
22/09	P = 7 cmH ₂ O
21	IAH = 2.2
	m. de uso: 6h 35'
29/09	P = 7 cmH ₂ O
21	IAH = 2.9
	m. de uso: 7h 06'
	± P = 7.5 cmH ₂ O
11/10	P = 7.6 cmH ₂ O
21	IAH = 2.9
	m. de uso: 7hs
26/10	P = 7.6 cmH ₂ O
21	IAH = 1.9
	m. de uso: 5h 30'
14/01	P = 7.6 cmH ₂ O
22	m. de uso: 7h 24'
	IAH = 2.3/h
	Fuga = 16.6 l/min
23/03	P = 7.6 cmH ₂ O
22	IAH = 2.2
	m. de uso: 6h 14'
	Bem adaptado
12/07	P = 7.6 cmH ₂ O
22	IAH = 2.0 l/min
	m. de uso: 7h 24'
	Bem adaptado.

fua

fua

fua

fua

fua

12/06/23 $P = 7.6 \text{ cmHg}$
 $M. de uso = 7h27'$
 $IAH = 1.8 \text{ e/lu}$
Bem adaptado

Nome: CRISTIANA TOLOSA PONTES

Sexo: F

Idade: 55 anos

Peso: 61.0 Kg

Altura: 165.0 cm

IMC: 22.4 Kg/m²

Atendimento: 18004413

Data: 01/09/2021

Exame: 32444043

ID: 3304525

Médico solicitante: Dr(a). FLAVIO AUGUSTO PASSARELLI PRADO

Laudo de Polissonografia: Resultado

O exame foi iniciado às 23:13:51 horas e finalizado às 06:04:21 horas. A **latência para o início do sono** foi de 21.3 min e a **latência para o início sono REM** de 98.0 min. O **tempo total de sono** (TTS) foi de 299.0 minutos, com **eficiência do sono** de 72.8%. A distribuição dos estágios do sono mostrou 19.7% de **estágio N1**, 56.7% de **estágio N2**, 11.2% de **estágio N3** e 12.4% de **sono REM**. O **tempo acordado após o adormecer** foi de 89.0 min. Ocorreram 133 **despertares**, sendo o índice de 20.6 (nº/h). O **índice de movimentos periódicos de membros inferiores** foi de 0.0 (nº/h), sendo 0.0 (nº/h) **associados a despertares**.

O número total de eventos respiratórios foi de 90, sendo 19 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 68 hipopneias obstrutivas, 0 hipopneias centrais e 3 "RERAs". O **índice de distúrbio respiratório** (IDR) foi de 18.1 (nº/h) e o **índice de apneia/hipopneia** (IAH) 17.5 (nº/h). O **índice de apneia/hipopneia obstrutiva** (IAHO) foi de 17.40 (nº/h) e o **índice de apneia/hipopneia central** (IAHC) foi de 0.00 (nº/h).

A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) **basal** foi de 96%, a **média** 96% e a **mínima** de 92%. O **índice de dessaturação** foi de 0.0 (nº/h) durante o sono REM e de 3.7 (nº/h) durante o sono NREM. Permaneceu 0.0% do tempo total de registro com SpO₂ abaixo de 90%.

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apneias + Hipopneias + RERAs

INSTITUTO DO
SONO

Instituto do Sono
Rua Marselhesa, 500 - Vl. Clementino
São Paulo - SP - CEP 04020-060
Tel.: (11) 2108-7777

Nome: CRISTIANA TOLOSA PONTES

Sexo: Feminino

Exame: 32444043

ID: 3304525

Idade: 55 anos

Data: 01/09/2021

Atendimento: 18004413

Médico Solicitante: Dr(a). FLAVIO AUGUSTO PASSARELLI PRADO

Conclusão

Polissonografia para titulação de CPAP com uso de máscara nasal tamanho pequeno.

A pressão atingida foi de 6 cm H₂O.

Diminuição dos eventos respiratórios anormais, melhora da saturação da oxi-hemoglobina e eliminação do ronco com CPAP no final do registro.

Redução da eficiência do sono, às custas do aumento do tempo acordado após início do sono.

Aumento do número de despertares.

Redução do sono ondas lentas.

Redução do sono REM.

Sugere-se a critério clínico controle da resposta terapêutica.


LUCIANA DE OLIVEIRA PALOMBINI
CRM 76102