

22222039489 DN 636

Dra Fabiana Braga. Cardiol

JEAN LOUIS SIMAL	
SINTOMAS / QUEIXAS	ronco; sonolência
MEDICAMENTOS	Crestor (rosuvastatina); Duocam (HAS); DAC vai fazer Holter
HORA QUE DORME: 22h30' - 23h30'	HORA QUE ACORDA: 7h30' melhora sono após 4h
BANHEIRO	1x (desperta várias x à noite)
TIPO DE RESPIRAÇÃO	Nasal
PRÁTICA EXERCÍCIO	3x semana (academia) / 2x caminhada
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5	ALMOÇO: 5 LANCHES JANTAR: 5
IDADE: 72	PESO: 87 Kg IAH: 31.8 MALLAMPATI: III SPO2:

→ Polissonografia cl titulacp CPAP - 4 cmH₂O
 ↳ IAH = 3.0 SpO₂ min 91%.

→ ↳ CPAP = IAH = 8.6 SpO₂??

17/03 P = 6.5 cmH₂O - mediana → 4.9.

23 M. de uso: 8h38

IAH = 1.3

Joa Cláudia

31/03 P = 5.0 cmH₂O

23 IAH = 1.2 elev

M. de uso: 7h41

IAH = 1.2 elev

fuga = 1.7 l/min

Bem adaptado

sem queixas

S/ ronco e S/ cansaço

Joa.

28/04 P = 5.5 cmH₂O

23 M. de uso: 8h30'

IAH = 1.1

fuga = 2.3 l/min

Bem adaptado.

Joa

29/05 P = 6 cmH₂O

2023 IAH = 1.5 elev

M. de uso = 8 horas

fuga = 10.5 l/min

↳ umidificacp 3 - condensou água

Bem adaptado.

30/06 P = 6 cmH₂O

23 IAH = 0.6 l/min.

M. de uso: 8:30

Bem adaptado

Troco o filtro.

Plenitude

Diuréticos

Banheiro (ox)

Sonolência (↓ ↓)

Joa

31/08

P = 6.0

IAH = 1.6

M. de uso: 7:45'

27/10

23

P = 6.0

IAH = 2.6

M. de uso: 7h40'

Biobslx

Relata estar dormindo tarde de-vindo a série que esta assist. Jua

18/01 P= 6cmH₂O
24 m. de uso: 7h 35'
IAH= 5.4
Fuga= 15.2
- Bem adaptado, dormiu de barriga p/cima.
- Começou a correr. *fua*

29/02 P= 6
24 m. de uso: 7h 40
IAH= 5.5 (4.2 central)
fuga: 17.8
Bem adaptado por em
dormir de barriga p/cima
- Oriento e lavar calcinha da Camada
- fazendo caminhada

06/06 P= 6cmH₂O
24 IAH= 2.1 e/h
m. de uso: 8h 38'
Fuga= 5.3 lpm.
Natachia
Bem adaptado, s/ queixas
Oriento lavagem nasal. *fua*

05/09 P= 6cmH₂O
24 IAH= 3.0 e/h
Fuga= 10 lpm. (med.)
Bem adapt. , s/ queixas de obstrução. *fua*

05/12/24 P= 6 cmH₂O
IAH= 4.6 e/h (IC: 3.6 e/h)
m. de uso: 8h
fuga= 14 l/min.
Bem adaptado / Sem queixas
silva

13/03 P= 6cmH₂O
25 IAH= 5.4 e/h
m. de uso: 7h 53'
fuga= 0.0 lpm.
Bem adaptado, s/ queixas
fua

13/06 P= 6cmH₂O
25 IAH= 5.6 e/h
M. de uso: 8h 6'
fuga= 14.2 lpm.
- Troco Filtro
- Oriento p/ lavar masc.
fua

Nome: JEAN LOUIS SIMAL

Data de Nascimento: 15-2-1952

IMC: 31,16

Sexo: Masculino

Data do exame: 26-01-2023

Peso: 89 kg

Altura: 1,69 m

Médico: DR^a. FABIANA G. MARCONDES

BRAGA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 26-01-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 515,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 5,0 e 146,5 minutos. O tempo total de sono foi de 341,5 min, eficiência de 66,2% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,4%; estágio N2: 55,5%; estágio N3: 17,9%; sono REM: 23,3%. O índice de despertares foi de 14,2/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 3,0/hora, sendo 1 obstrutiva, 0 mistas e 0 centrais e 16 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e a mínima de 91%, permanecendo 0,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 41 - 90 bpm e NREM de 40 - 86 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (3), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latência para o sono REM aumentada;
4. aumento do número de despertares breves;
5. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (87,0/hora);
6. presença de atividade em EMG de queixo;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 4 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: JEAN LOUIS SIMAL			
Sexo: M	Idade: 70 anos	Peso: 87 Kg	Altura: 1,69 m
IMC: 30,5	Data do Exame: 08/12/2022	Exame: 00209_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 23:13:10 horas e encerrado às 05:24:53 horas, com latência para o sono de 7 minutos e latência para o sono REM de 314 minutos. O tempo total de sono foi de 245,5 minutos, com eficiência do sono de 66,0%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	2,2%	Até 5%
Estágio 2	83,1%	45 - 55%
Estágio 3	10,2%	> 15%
Sono REM	4,5%	20 - 25%
Eficiência do sono	66,0%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 119,5 minutos ocorreram **352 despertares** (índice de 86,0 /hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 63 bpm, a maior de 82 bpm e a menor de 48 bpm.

Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0,0/hora associados a despertares.**


Ocorreram 320 eventos respiratórios, sendo 0 central, 320 obstrutivos e 0 misto. Sendo 212 apnéias, 108 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 78,2/hora**, sendo 51,8 apnéia/hora e 26,4 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 24,7 e a duração máxima de 48,6.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi **81,8/hora**, sendo 81,8 apnéia/hora e 0,0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de 94%, sendo a saturação média de 85%, a maior de 95% e a mínima de 65%, permanecendo 340,8 minutos (91,6%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 7,7 minutos (2,1%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 323 dessaturações. Índice de dessaturações: 78,9/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 82,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 79,0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuada (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono reduzida.


 Henrique Pedro Magoia Filho
 Otorrinolaringologia /
 Distúrbios Respiratórios do Sono
 CRM-SP 129264