

Polissonografia tipo IV de noite inteira
(inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®

Centro credenciado

Sonofisio - SONOFISIO

Telefone

12 3921-1001

Paciente

Nome Rosana Mary Venturini Cavali

Data de nasc. 12/06/1963 (59 anos)

Sexo Feminino

Exame

Início 11/04/2023 – 22:33:58

Fim 12/04/2023 – 06:46:14

Tempo total 08:12:16 (492,3 min)

Tempo válido 07:06:41 (426,7 min)

Condições na noite do exame

☐ Consumo de álcool

☒ Congestão nasal

☐ Sedativos

☐ Nenhuma

Tratamentos na noite do exame

☒ CPAP (08:11)

☐ Aparelho de avanço

☐ Nenhum

Questionário do exame**Peso e altura**

Respondido em 11/04/2023

Peso 60 kg

Altura 1,59 m

IMC 23,7

Sintomas

Respondido em 11/04/2023

☐ Ronco alto e frequente

☒ Dificuldade para manter o sono

☒ Sono agitado

☒ Sono não reparador

☐ Sonolência ou cansaço diurno

☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

☐ Dificuldade de concentração

☐ Perda de memória

☒ nariz entupido ao deitar

☐ Nenhum

Doenças associadas

Respondido em 11/04/2023

☐ Hipertensão arterial sistêmica

☐ Doença arterial coronária

☐ Insuficiência cardíaca

☒ Arritmia cardíaca

☐ Acidente vascular cerebral (AVC)


☐ Diabetes

☐ Depressão

☐ Refluxo gastroesofágico

☐ Doença respiratória

☐ Nenhuma

Resultado**Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)**

IDO < 5 Normal

5 ≤ IDO < 15 Compatível com apneia do sono leve

15 ≤ IDO < 30 Compatível com apneia do sono moderada

IDO ≥ 30 Compatível com apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia tipo IV realizado no dia 11/04/2023, iniciado às 22:33 e terminado às 06:46. O tempo total de registro foi de 8h12min (492 minutos) e o tempo válido foi de 7h06min (426 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 53 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 7,5/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 94% e não permaneceu abaixo de 90% por tempo significativo. Foram detectados eventos de ronco durante 1% do tempo de registro.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono leve (IDO 7,5/hora), nas condições descritas e com o uso de CPAP.

Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1


Nota: considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3 pontos percentuais no nível de saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂). Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 90% durante ao menos 5 minutos com um nadir de 85%. Os índices correspondem ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.

Polissonografia tipo IV de noite inteira (inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®

Oximetria (SpO₂)


Histograma SpO₂ (%) × fração do tempo (%)



SpO ₂ mínima	83%
SpO ₂ média	94%
SpO ₂ máxima	100%
Tempo com SpO ₂ < 90%	3,2 min (0%)
Tempo com SpO ₂ < 80%	0,0 min (0%)
Número de dessaturações	53
Índice de dessat. de oxigênio (IDO)	7,5 /hora
Índice de dessat. de oxigênio sono (IDOs)	3,9 /hora
Índice de hipoxemia noturna	0,00 /hora

Frequência Cardíaca (FC)

Histograma FC (bpm) × fração do tempo (%)




FC mínima	45 bpm
FC média	56 bpm
FC máxima	92 bpm

Sono estimado

Tempo total de sono	386,5 min
Tempo para dormir	4,0 min
Tempo acordado pós-sono	71,0 min
Eficiência do sono	79%

Análise de ronco

Tempo de gravação	491,0 min
Tempo com ronco	5,0 min (1%)



Polissonogramas

