

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA PARA TITULAÇÃO DE CPAP

Nome: LUIS CARLOS COLICCHIO RAYMUNDO

Sexo: Masculino

Data do Exame: 20-07-2025

Idade: 51 anos

Peso: 90 kg

Altura: 1,72 m

Médico Solicitante: DR. FLAVIO AUGUSTO PASSARELLI
PRADO

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 20/07/2025 21:57 e finalizado às 21/07/2025 05:46.

A latência para início do sono foi de **43,5** min e a latência para o sono REM de **103,5** min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 322,5 min, com eficiência do sono de **68,8 %**.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **2,2 %** de estágio N1, **55,3 %** de estágio N2, **20,2 %** de estágio N3 e **22,3 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 103,0 min. Ocorreram 44 despertares, sendo o índice de **5,6 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **14,3 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 28, sendo 0 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 28 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **5,2 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 16,7 e o IDR durante o sono NREM foi de 1,9. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 5,2 (nº/h), sendo 0,0 apneia/h e 5,2 hipopneia/h.

A **saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂)** basal foi 94%, a **média** de 93% e a **mínima** de 89%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (**IDO**) foi de 3,5 (nº/h), sendo que em REM foi de 16,7 (nº/h) e em NREM foi de 1,7 (nº/h). Permaneceu 0,0 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (10), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **5,2 (nº/h)**;
2. Saturação da oxi-hemoglobina preservada (**89%**);
3. Aumento da latência para o início do sono (**43,5 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM normal (**103,5 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono reduzida (**68,8 %**) (VN= $\geq 85\%$);
6. Índice de despertares normal (**5,6 nº/h**) (VN= até 15 nº/h);
7. Percentual do estágio N1 normal (**2,2 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Ligeiro aumento do percentual do estágio N2 (**55,3 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta normal (**20,2 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM normal (**22,3 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco leve, esporádico verificado via sensor de ronco;
12. O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **14,3 (nº/h)**;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.


Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 5 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.



Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

DADOS DO PACIENTE:

Nome: LUIS CARLOS COLICCHIO RAYMUNDO
ID: 0
Altura: 1,72 m
Peso: 90 kg
Sexo: Masculino
Data de Nascimento: 26-11-1973
IMC: 30,42

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 21:57:19
Data do Exame: 20-07-2025
Médico Solicitante: DR. FLAVIO AUGUSTO PASSARELLI PRADO

Análise do Sono	
Data/Horário de Início:	20/07/2025 21:57
Data/Horário de Término:	21/07/2025 05:46
Tempo Total de Registro (TTR):	469,0
Tempo Total de Sono (TTS):	322,5
Latência para o início do sono:	43,5
Latência para o sono REM:	103,5
Tempo acordado após o adormecer:	103,0
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	68,8 %

Estágios do Sono					
	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	7,0	178,5	65,0	72,0	146,5
% de TTS	2,2	55,3	20,2	22,3	31,2

Despertares		
	Número	Índice (nº/h)
Total de despertares	44	5,6

Frequência Cardíaca		
	Média [bpm]	Máx [bpm]
REM	72,2	105
NREM	67,3	97
Vigília	71,8	108

Apneias/Hipopneias/RERAs								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	"RERA"	A + H + "RERA"
	Central	Obstrutiva	Mista					
Número	0	0	0	0	28	28	0	28
Índice	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2	0,0	5,2
Índice em REM	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	16,7	0,0	16,7
Índice em NREM	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9
Duração máx (seg)	0	0	0	0	36,0	36,0	0	36,0
Duração média (seg)	0	0	0	0,0	25,3	25,3	0	25,3
Índice em Supino	0	0	0	0	0	0	0	0
Índice em Não Supino	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2	0,0	5,2

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;

- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;

- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 5,2 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 5,2 (nº/h)

DADOS DA OXIMETRIA		
	Média de SAO2	Menor SAO2
Sono:	93%	89%
NREM:	93%	91%
REM:	92%	89%
Vigília:	94%	91%

Valor de oximetria predominante durante o sono: 94%

Total de dessaturações: 27

"PLMS" (Periodic limb movements in sleep) Movimentos periódicos de membros inferiores durante o sono		
EMG tibial bilateral	Número	Índice (nº/h)
"PLMS"	0	0,0
"PLMS" associados a despertares	0	/


DADOS DE BRUXISMO:


TST	<i>Bruxismo</i>
# Ocorrências	0
Index (occurrences/h)	0,0
NREM	<i>Bruxismo</i>
# Ocorrências	0
Index (ocorrência/h)	0,0
REM	<i>Bruxismo</i>
# Ocorrências	0
Index (ocorrência/h)	0,0
VIGÍLIA	<i>Bruxismo</i>
# Ocorrências	0
Index (ocorrência/h)	0,0

POSIÇÃO DE OCORRÊNCIAS DAS APNEIAS:

	REM				
	AC	AO	AM	Hipo	RERA
PRONE	0	0	0	0	0
DIREITO	0	0	0	0	0
ESQUERDO	0	0	0	20	0
SUPINO	0	0	0	0	0
	NREM				
	AC	AO	AM	Hipo	RERA
PRONE	0	0	0	0	0
DIREITO	0	0	0	0	0
ESQUERDO	0	0	0	8	0
SUPINO	0	0	0	0	0

RESUMOS GRÁFICOS:





	Resultados	Valor de normalidade (VN)
Eficiência do sono	68,8 %	≥85%
Latência para o início do sono	43,5 min	até 30 min.
Latência para o sono REM	103,5 min	70 a 120 min.
Percentual do estágio N1	2,2 %	VN= 2% a 5%
Percentual do estágio N2	55,3 %	VN= 45% a 55%
Percentual do estágio N3	20,2 %	VN= 13% a 23%
Percentual do estágio REM	22,3 %	VN= 20% a 25%
Vigília:	31,2 %	5%
Índice de despertares	5,6 (nº/h)	até 15 nº/h
(IDR) Índice de distúrbio respiratório	5,2 (nº/h)	VN= até 5 nº/h 5 a 15 nº/h leve 15 a 30 nº/h moderado > de 30 nº/h elevado).
(PLM) Movimentos periódicos de pernas	0,0 /h	até 15 nº/h