
Nome:	LUIS CARLOS COLICCHIO RAYMUNDO		
Sexo:	Masculino	Idade:	51 anos
Exame:	34783128	Data:	23/06/2025
Médico Solic.:	FLAVIO AUGUSTO PASSARELLI PRADO		
		Atendimento:	18444167
		ID:	3527467

Conclusão

Aumento acentuado do índice de apneia e hipopneia, eventos obstrutivos.

Dessaturação da oxihemoglobina.

Aumento do índice de despertares

Presença de ronco leve/intenso e constante nessa noite de registro.

Eficiência do sono reduzida pelo aumento dos períodos em vigília após adormecer.

Redução do sono REM.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luciane", is centered above the printed name.

LUCIANE IMPELLIZIERE LUNA DE MELLO
CRM 98798

Nome: LUIS CARLOS COLICCHIO RAYMUNDO

Sexo: M

Idade: 51 anos

Atendimento: 18444167

Peso: 86.0 Kg

Altura: 172.0 cm

IMC: 29.1 Kg/m²

Data: 23/06/2025

Exame: 34783128

ID: 3527467

Médico solicitante: Dr(a). FLAVIO AUGUSTO PASSARELLI PRADO

Laudo de polissonografia: resultado

O exame foi iniciado às 22:27:51 horas e finalizado às 05:12:03 horas. A **latência para o início do sono** foi de 22.0 minutos e a **latência para o início sono REM**, de 164.0 minutos. O **tempo total de sono** (TTS) foi de 277.0 minutos, com **eficiência do sono** de 68.5%. A distribuição dos estágios do sono mostrou 9.0% de **estágio N1**, 57.0% de **estágio N2**, 17.9% de **estágio N3** e 16.1% de **sono REM**. O **tempo de vigília após o adormecer** foi de 105.2 minutos. Ocorreram 166 **despertares**, uma média de 36.0 por hora. O **índice de movimentos periódicos de membros durante o sono** (PLMS – *periodic limb movements in sleep*) foi de 9.5 por hora, sendo 0.2 PLMS por hora **associados a despertares**.

A quantidade total de eventos respiratórios registrados foi de 170, sendo 51 apneias obstrutivas, 3 apneias centrais, 1 apneias mistas, 115 hipopneias obstrutivas, 0 hipopneias centrais e 0 despertares associados a esforço respiratório (RERA – *respiratory effort-related arousal*). O **índice de distúrbio respiratório** (IDR) foi de 36.8 por hora e o **índice de apneia/hipopneia** (IAH), de 36.8 por hora. O **índice de apneia/hipopneia obstrutiva** (IAHO) foi de 36.10 por hora e o **índice de apneia/hipopneia central** (IAHC), de 0.60 por hora.

A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) **basal** foi de 95%; a **média**, 94% e a **mínima**, 84%. O **índice de dessaturação** foi de 35.1 por hora durante o sono REM e 8.8 por hora durante o sono NREM. A saturação permaneceu abaixo de 90% por 1.3% do tempo total de registro.

Índice de distúrbio respiratório (IDR) = índice de apneias + hipopneias + RERA

Procedimento

Exame polissonográfico noturno registrado no sistema Alice 6 LDxS. Foram utilizados parâmetros fornecidos por eletroencefalograma (F4-M1, F3-M2, C4-M1, C3-M2, O2-M1, O1-M2); eletro-oculograma bilateral; eletromiograma (mentoniano/submentoniano e tibial bilateral); eletrocardiograma (montagem D2 modificada); cânula de pressão (fluxo aéreo) e termistor (fluxo oronasal); pletismografia por indutância (esforço respiratório torácico e abdominal); oximetria de pulso (saturação percutânea da oxi-hemoglobina – SpO₂); capnometria (P_{ET}CO₂); sensor de ronco (microfone) e posição corporal no leito.

Parâmetros de registro recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (2020)

Análise do sono

Data e horário de início	23/06/2025 22:27:51
Data e horário de término	24/06/2025 05:12:03
Tempo total de registro (TTR)	404.2 min
Tempo total de sono (TTS)	277.0 min
Latência para o início do sono	22.0 min
Latência para o sono REM	164.0 min
Tempo em vigília após adormecer	105.2 min
Eficiência do sono (TTS/TTR x 100)	68.5%

Estágios do sono

	N1	N2	N3	REM	Vigília
Duração (min)	25.0	158.0	49.5	44.5	103.0
Distribuição no TTS (%)	9.0	57.0	17.9	16.1	*

Despertares

	Eventos	Índice (por hora)
Total de despertares	153	33.1

Movimentos periódicos de membros durante o sono (PLMS - *periodic limb movements in sleep*)

EMG tibial bilateral	Eventos	Índice (por hora)
PLMS	44	9.5
PLMS associados a despertares	1	0.2

Parâmetros de análise recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (2020)

Eventos respiratórios

	Total de eventos	Índices (por hora)					Duração (seg)	
		REM	NREM	TTS	Supino	Não supino	Máxima	Média
Apneia obstrutiva (AO)	51	36.4	6.2	11.0	25.9	1.76	28.5	20.2
Apneia mista (AM)	1	1.3	0.0	0.2	0.6	0.00	23.5	23.5
Hipopneia obstrutiva (HO)	115	4.0	28.4	24.9	*	*	39.0	18.2
RERA	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
AO+AM+HO	167.00	32.00	52.40	36.10	*	*	91.00	61.90
AO+AM+HO+RERA	167.00	32.00	52.40	36.10	*	*	91.00	61.90
Apneia central (AC)	3	2	1	0.6	1.7	0.00	19.5	17.5
Hipopneia central (HC)	0	0.0	0.0	0.0	*	*	0.0	0.0
AC+HC	3.00	2.00	1.00	0.60	*	*	19.50	17.50

Índice de apneia + hipopneia obstrutiva (IAHO): 36.10 (por hora)

IAH(O+C): 36.8 (por hora)

Índice de apneia + hipopneia central (IAHC): 0.60 (por hora)

Índice de hipopneia central e obstrutiva: 41.1 (por hora) em supino e 14.79 (por hora) em não supino

Índice de distúrbio respiratório (IDR): 36.8 (por hora)

Tempo de respiração de Cheyne-Stokes: 0.00 (min)

Parâmetros de análise recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (2020)

- **Apneia:** queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, por 10 segundos ou mais.
- **Hipopneia obstrutiva:** queda de 30% do fluxo por 10 segundos ou mais associada a 3% ou mais de dessaturação ou despertar; presença de movimento paradoxal de caixa torácica, achatamento da curva de pressão nasal ou ronco durante o evento.
- **Hipopneia central:** queda de 30% do fluxo por 10 segundos ou mais associada a 3% ou mais de dessaturação ou despertar; ausência de movimento paradoxal de caixa torácica, achatamento da curva de pressão nasal e ronco durante o evento.
- **RERA:** achatamento da curva de fluxo aéreo pela cânula de pressão por 10 segundos ou mais associado a despertar do EEG.
- **Respiração de Cheyne-Stokes:** presença de respiração periódica com padrão crescendo-decrescendo alternado por apneias ou hipopneias centrais, por 40 segundos ou mais.

Saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂)

Saturação média	94%	Saturação TTR < 90%	1.3% (5.1 min)
Saturação mínima	84%	Saturação REM < 90%	1.3% (5.1 min)
		Saturação NREM < 90%	0.0% (0.0 min)
Saturação média na vigília	95%		
Saturação média no sono REM	93%	Saturação < 80%	0.0% TTR (0.0 min)
Saturação média no sono NREM	94%	Saturação < 70%	0.0% TTR (0.0min)
Total de dessaturações	60		
Índice de dessaturação no sono		13.0 (por hora)	
Índice de dessaturação no sono REM		35.1 (por hora)	
Índice de dessaturação no sono NREM		8.8 (por hora)	

Hipnograma

