

Sistema

NS

ROBSON HARUO MATSUMOTO

IDADE: 39 anos PESO: 76 ALTURA: 1,63 PROFISSÃO: Agricultor

SINTOMAS: sono, sonolência

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: 0

MÉDICO: Dr. Carlos Zampieri (cardio).

EXERCÍCIO FÍSICO: 3 a 4x semana

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: -

HORA QUE ACORDA: -

COCHILO () SIM () NÃO

DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO:

BANHEIRO: 0

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP:

MALLAMPATI:

IAH: 31

SPO2:

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS

PSG: CPAP = 6,5 cmH₂O

01/09/23 Adaptação: Adaptação Yuwell - máx. Insp (S)
CPAP: 6,5 cmH₂O

15/09/23 P = 6,5 cmH₂O Oriento sobre o uso
IAH = 14,9 e/h
m. de uso: 2h27' fua.

22/09/23 P = 6,5 cmH₂O (fixa) máx. Insp - oriento uso
IAH = 2,8 e/h
m. de uso = 3 horas

29/09/23 P = 6,5 cmH₂O Bem melhor; conseguiu usar
IAH = 4,4 e/h
m. de uso = 5 horas

06/10/23 P = 6,5 está conseguindo usar mais horas.
IAH = 5,3 e/h
m. de uso = 6h28' ↑ P: 7 cmH₂O
fua = 1,3 l/min

20/10/23 P = 7 cmH₂O
IAH = 4,8 e/h
m. de uso = 4h50'

10/11/23 P = 7 cmH₂O
IAH = 2,6 e/h
m. de uso: 4h34'

Bem adaptado, porém ritmo de sono. fua.

08/12 P= 7cmH₂O ajuste mais.

23 IAH= 2.8
m. de uso: 7hr
fuga = 0 lpm

fua cláudio

12/01 P= 7cmH₂O

24 IAH= 4.2
Vazamento = 33 lpm.
Bem adaptado.

fua cláudio

13/05 P= 7cmH₂O

24 IAH= 4,6 e/h
fuga: 28 l/m

Oriento decubito lateral
pl dormir

Bem adaptado

Natasha

30/08 P= 7cmH₂O

2024 IAH= 2,9 e/h
fuga: 26 l/min
m uso: 4h42.

Bem adaptado

seu

oriento limpeza

04/02 P= 6,9cmH₂O

25 IAH= 2.7 e/h
m. de uso: 7h40'
fuga = 7 lpm.

Bem adaptado

entrego a água.

fua.

CLÍNICA
DR. ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Robson Haruo Matsumoto
EXAME nº: 5360-2 CPAP
SOLICITADO POR: Dr. Ércio Álvaro Nakano
DATA: 03/07/2023
IDADE: 39 anos

Comentários:

Exame iniciado às 21h28min e concluído às 05h46min. A latência para o sono foi de 8 minutos e a latência para o estágio REM, de 32 minutos. O tempo total de sono foi de 466,5 minutos (07h46min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 93,7%. A distribuição do sono mostrou 5,3% de estágio 1, 53,7% de estágio 2, 20,2% de estágio 3 e 20,9% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 23 minutos em vigília, ocorreram 37 microdespertares (Índice: 4,8/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 2,3/hora, sendo 0 apneia/hora e 2,3 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 2,3/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 97%, sendo a saturação média de 96% e a mínima de 84%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia de Matos (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara nasal Mirage Activa medium (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 6,5 cm de H₂O.

Os índices de apneia/hipopneia (2,3/hora; normal até 4/hora) e de distúrbio respiratório (2,3/hora) permaneceram nos limites da normalidade. Registraram-se episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina, principalmente no início do sono. O ritmo cardíaco foi sinusal e as frequências cardíacas foram: mínima: 46; máxima: 63 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 8 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava encurtada (32 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (93,7%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (4,8/hora; normal até 15/hora) permaneceram nos limites da normalidade. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 3 (20,2%; normal: 15-16%) e REM (20,9%; normal: 20%). As porcentagens dos estágios 1 (5,3%; normal: 5%) e 2 (53,7%; normal: 45-55%) permaneceram nos limites da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros.

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM-SP 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730