

ELOIZA CARLOS DA SILVA MATTOS

HD: AOS.
 MEDICO: Drº Mário Sérgio Carreiros
 MEDICAMENTOS:
 IMC
 CIRCUNF. DE PESCOÇO
 PA:
 OXIMETRIA:

24/08 P= 10 cmH₂O

IAH: 8.3/h

m. de uso: 6h43

TROCO O FILTRO

lua

P= 10 cmH₂O

IAH=

m. de uso: 7h13'

27/08/24 P= 10 cm H₂O

Aparelho não informa IAH

m de uso: 7h57'

* Troco filtro

Natasha

Nome: ELOIZA CARLOS DA SILVA MATTOS

Data de Nascimento: 6-6-1964

IMC: 30,47

Sexo: Feminino

Data do exame: 04-06-2021

Peso: 78 kg

Altura: 1,60 m

Médico: DR. MÁRIO SÉRGIO LEONE

CARREGOSA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 04-06-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição do ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 495,5. As latências de estágio N1 e sono de respectivamente, 26,5 e 166,0 minutos. O tempo total de sono foi de 369,5, eficiência de 74,6 (85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N2: 60,6%; estágio N3: 16,0%; sono REM: 20,2%. O índice de despertares foi c (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 8,3/hora, sendo elas 6 obstrutivas, 0 mistas e 45 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e mínima de 86%, permanecendo 7,4% do tempo de re saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 55 - 95 bpm e NRE bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono Epworth (5), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latência para o sono REM aumentada;
- ➔ 4. aumento do número de despertares breves;
- ➔ 5. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (36,5/hora);
6. registro de ronco durante o sono.


**Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pr
terapêutica de 6,0 cmH2O.**

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono