

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Paulo Roberto de Carvalho Scamilla

EXAME nº: 2701

SOLICITADO POR: Dr. Roberto Schoueri Junior

DATA: 10/10/2013

IDADE: 60 anos

Comentários:

Exame **iniciado** às 23h14min e **concluído** às 05h55min. A **latência para o sono** foi de 2 minutos e a **latência para o estágio REM**, de 187 minutos. O **tempo total de sono** foi de 347 minutos, com **eficiência de sono** (T T S / T T R)* de 86%. A distribuição do sono mostrou 51,9% de **estágio 1**, 33% de **estágio 2**, 7,8% de **estágio 3** e 7,3% de **estágio REM**. No período total de sono permaneceu 54,5 minutos em **vigília**, ocorreram 434 **microdespertares** (índice: 75/hora).

O **índice de movimentos periódicos de membros** foi de 38,7/hora.

O **índice de apneia/hipopneia** foi de 42,9/hora, sendo 22,3 apneia/hora e 20,6 hipopneia/hora. O **índice de distúrbio respiratório** (apneia+hipopneia+RERA) foi de 49,3/hora. A **saturação basal da oxi-hemoglobina** foi de 95%, sendo a saturação média de 91% e a mínima de 57%.

(*) **T T S** ⇨ Tempo Total de Sono **T T R** ⇨ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (42,9/hora; normal até 4/hora; índice acentuado: 30 eventos e acima/hora) e de distúrbio respiratório (49,3/hora), episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina, acentuando-se durante o estágio REM, despertares e arritmia cardíaca. As frequências cardíacas foram: mínima: 63; máxima: 168 bpm.

O ronco foi contínuo e alto.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 2 min.; normal até 30 min) – ele ingeriu 18 mg de Lexotan® às 22h00min. A latência para o estágio REM estava alongada (187 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono adequada (86%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (434; 75/hora; normal até 15/hora) – observou-se a intrusão de ritmo rápido medicamentoso nos estágios 2 e 3. Houve o aumento da porcentagem do estágio 1 (51,9%; normal: 8-10%) e a redução dos estágios 2 (33%; normal: 45-55%), 3 (7,8%; normal: 10-12%) e REM (7,3%; normal: 19-20%).

Aumento moderado do índice de movimentos periódicos de membros (38,7/hora; índice moderado: 25 a 49/hora).

Escala de Sonolência de Epworth: 11 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).