

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA PARA TITULAÇÃO CPAP

Nome: CREUSA LEANDRO BASTOS RUIVO
Data do Exame: 10-06-2025
Peso: 68,2 kg
Médico Solicitante: DR. RAPHAEL FORNACIARI

Sexo: Feminino
Idade: 67 anos
Altura: 1,54 m

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 10/06/2025 21:44 e finalizado às 11/06/2025 05:44.

A latência para início do sono foi de **61,0** min e a latência para o sono REM de **146,5** min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 350,5 min, com eficiência do sono de **73,1** %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **2,7** % de estágio N1, **52,5** % de estágio N2, **23,1** % de estágio N3 e **21,7** % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 68,0 min. Ocorreram 158 despertares, sendo o índice de **19,8 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **22,1 (nº/h)**, O associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 114, sendo 10 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 104 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **19,5 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 28,4 e o IDR durante o sono NREM foi de 17,0. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 19,5 (nº/h), sendo 1,7 apneia/h e 17,8 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 94%, a média de 93% e a mínima de 82%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 13,4 (nº/h), sendo que em REM foi de 26,1 (nº/h) e em NREM foi de 16,2 (nº/h). Permaneceu 2,6 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e de Epworth (13), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Saturação da oxi-hemoglobina (82%);
2. Aumento da latência para o início do sono (61,0 min) (VN= 5 a 30 min);
3. Aumento da latência para o início do sono REM (146,5 min) (VN= 70 a 120 min);
4. Eficiência do sono reduzida (73,1 %) (VN= $\geq$ 85%);
5. Aumento do índice de despertares (19,8 n^o/h) (VN= até 15 n^o/h);
6. Percentual do estágio N1 normal (2,7 %) (VN= 2% a 5%);
7. Percentual do estágio N2 normal (52,5 %) (VN= 45% a 55%);
8. Ligeiro aumento do percentual do estágio N3 ondas delta (23,1 %) (VN= 13% a 23%);
9. Percentual do estágio REM normal (21,7 %) (VN= 20% a 25%);
10. Ronco leve, intermitente verificado via sensor de ronco;
11. O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 22,1 (n^o/h);
12. Presença de atividade em EMG de queixo.

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA


Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 8 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: CREUSA LEANDRO BASTOS RUIVO

Data do Exame: 10-06-2025

DADOS DO PACIENTE:

Nome: CREUSA LEANDRO BASTOS RUIVO
ID: 0
Altura: 1,54 m
Peso: 68,2 kg
Sexo: Feminino
Data de Nascimento: 12-6-1958
IMC: 28,76

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 21:44:34
Data do Exame: 10-06-2025
Médico Solicitante: DR. RAPHAEL FORNACIARI

Análise do Sono

Data/Horário de Início:	10/06/2025 21:44
Data/Horário de Término:	11/06/2025 05:44
Tempo Total de Registro (TTR):	479,5
Tempo Total de Sono (TTS):	350,5
Latência para o início do sono:	61,0
Latência para o sono REM:	146,5
Tempo acordado após o adormecer:	68,0
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	73,1 %

Estágios do Sono

	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	9,5	184,0	81,0	76,0	129,0
% de TTS	2,7	52,5	23,1	21,7	26,9

Despertares			
		Número	Índice (nº/h)
Total	de	158	19,8
despertares			
Frequência Cardíaca			
		Média [bpm]	Máx [bpm]
REM		57,5	76
NREM		58,6	76
Vigília		59,6	79

Apneias/Hipopneias/RERAs								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	"RERA"	A + H + "RERA"
	Central	Obstrutiva	Mista					
Número	0	10	0	10	104	114	0	114
Índice	0,0	1,7	0,0	1,7	17,8	19,5	0,0	19,5
Índice em REM	0,0	3,2	0,0	3,2	25,3	28,4	0,0	28,4
Índice em NREM	0,0	1,3	0,0	1,3	15,7	17,0	0,0	17,0
Duração máx (seg)	0	31,6	0	31,6	50,2	50,2	0	50,2
Duração média (seg)	0	17,8	0	17,8	21,6	19,7	0	19,7
Índice em Supino	0	0	0	0	6,8	6,8	0	6,8
Índice em Não Supino	0,0	2,1	0,0	2,1	20,2	22,2	0,0	22,2

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;
- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;
- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 19,5 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 19,5 (nº/h)

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: CREUSA LEANDRO BASTOS RUIVO

Sexo: Feminino

Data do Exame: 27-02-2025

Idade: 66 anos

Peso: 68.200 kg

Altura: 1,54 m

Médico Solicitante: DR. RAPHAEL FORNACIARI

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 27/02/2025 21:33 e finalizado às 28/02/2025 05:44.

A latência para início do sono foi de **19,5 min** e a latência para o sono REM de **146,5 min**.

O tempo total de sono (TTS) foi de 366,5 min, com eficiência do sono de **74,6 %**.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **4,8 %** de estágio N1, **26,6 %** de estágio N2, **24,4 %** de estágio N3 e **44,2 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 105,0 min. Ocorreram 201 despertares, sendo o índice de **24,6 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 269, sendo 6 apneias obstrutivas, 4 apneias centrais, 0 apneias mistas, 259 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **44,0 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 51,5 e o IDR durante o sono NREM foi de 38,1. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 44,0 (nº/h), sendo 1,6 apneia/h e 42,4 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 91%, a média de 90% e a mínima de 79%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 23,5 (nº/h), sendo que em REM foi de 47,8 (nº/h) e em NREM foi de 18,5 (nº/h). Permaneceu 11,9 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

DADOS DO PACIENTE:

Nome: CREUSA LEANDRO BASTOS RUIVO
ID: 0
Altura: 1,54 m
Peso: 68.200 kg
Sexo: Feminino
Data de Nascimento: 12-6-1958
IMC: 28,76

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 21:33:31
Data do Exame: 27-02-2025
Médico Solicitante: DR. RAPHAEL FORNACIARI

Análise do Sono	
Data/Horário de Início:	27/02/2025 21:33
Data/Horário de Término:	28/02/2025 05:44
Tempo Total de Registro (TTR):	491,0
Tempo Total de Sono (TTS):	366,5
Latência para o início do sono:	19,5
Latência para o sono REM:	146,5
Tempo acordado após o adormecer:	105,0
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	74,6 %

Estágios do Sono					
	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	17,5	97,5	89,5	162,0	124,5
% de TTS	4,8	26,6	24,4	44,2	25,4

Despertares			
		Número	Índice (nº/h)
Total despertares	de	201	24,6

Frequência Cardíaca		
	Média [bpm]	Máx [bpm]
REM	55,5	71
NREM	55,4	69
Vigília	57,1	74

Apneias/Hipopneias/RERAs								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	"RERA"	A + H + "RERA"
	Central	Obstrutiva	Mista					
Número	4	6	0	10	259	269	0	269
Índice	0,7	1,0	0,0	1,6	42,4	44,0	0,0	44,0
Índice em REM	1,5	1,1	0,0	2,6	48,9	51,5	0,0	51,5
Índice em NREM	0,0	0,9	0,0	0,9	37,3	38,1	0,0	38,1
Duração máx (seg)	26,6	34,3	0	34,3	79,7	79,7	0	79,7
Duração média (seg)	21,9	21,1	0	21,5	24,5	22,5	0	22,5
Índice em Supino	0	1,3	0	1,3	52,0	53,3	0	53,3
Índice em Não Supino	0,9	0,7	0,0	1,5	37,8	39,3	0,0	39,3

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;

- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;

- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 44,0 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 44,0 (nº/h)