

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: THIAGO OLIVERA DE SANTANA SUDO

Sexo: Masculino

Data do Exame: 07-12-2024

Idade: 29 anos

Peso: 130 kg

Altura: 1,83 m

Médico Solicitante: DRA. ANDREIA ALESSANDRA
BISANHA

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 07/12/2024 21:20 e finalizado às 08/12/2024 05:46.

A latência para início do sono foi de **27,0** min e a latência para o sono REM de **119,5** min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 413,0 min, com eficiência do sono de **81,8** %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **1,8** % de estágio N1, **51,7** % de estágio N2, **22,8** % de estágio N3 e **23,7** % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 65,0 min. Ocorreram 56 despertares, sendo o índice de **6,6 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 62, sendo 1 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 61 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **9,0 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 10,4 e o IDR durante o sono NREM foi de 8,6. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 9,0 (nº/h), sendo 0,1 apneia/h e 8,9 hipopneia/h.

A **saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂)** basal foi 94%, a **média** de 94% e a **mínima** de 84%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (**IDO**) foi de 7,4 (nº/h), sendo que em REM foi de 10,4 (nº/h) e em NREM foi de 8,6 (nº/h). Permaneceu 2,1 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO

1. Presença de dessaturação da oxi-hemoglobina associado aos eventos respiratórios anormais;
2. Latência para o início do sono normal **(27,0 min)** (VN= até 30 min);
3. Latência para o início do sono REM normal **(119,5 min)** (VN= 70 a 120 min);
4. Eficiência do sono diminuída **(81,8 %)** (VN= $\geq 85\%$);
5. Índice de despertares normal **6,6 n^o/h** (VN= até 15 n^o/h);
6. Diminuição do percentual do estágio N1 **(1,8 %)** (VN= 2% a 5%);
7. Percentual do estágio N2 normal **(51,7 %)** (VN= 45% a 55%);
8. Percentual do estágio N3 ondas delta normal **(22,8 %)** (VN= 13% a 23%);
9. Percentual do estágio REM normal **(23,7 %)** (VN= 20% a 25%);
10. Ronco constante verificado via sensor de ronco durante a leitura do exame;

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 9,0cmH2O.



Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.57

PROCEDIMENTO:

Exame polissonográfico noturno registrado no sistema (NeuroVirtual)®. Foram utilizados os registros de EEG: F4-M1, C4-M1, O2-M1, F3-M2, C3-M2 e O1-M2; EOG: bilateral; EMG: submentoniano; EMG: tibial bilateral; ECG: montagem D2 modificada; fluxo aéreo nasal por cânula de pressão e oronasal por termistor; esforço respiratório torácico e abdominal por pletismografia; saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) por oximetria de pulso; sensor de ronco (pela cânula nasal) e posição corporal no leito.

Parâmetros de registro recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (versão 3.0/2022)

DADOS DO PACIENTE:

Nome:	THIAGO OLIVERA DE SANTANA SUDO
ID:	0
Altura:	1,83 m
Peso:	130 kg
Sexo:	Masculino
Data de Nascimento:	21-12-1994
IMC:	38,82

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame:	21:20:58
Data do Exame:	07-12-2024
Médico Solicitante:	DRA. ANDREIA ALESSANDRA BISANHA

Análise do Sono	
Data/Horário de Início:	07/12/2024 21:20
Data/Horário de Término:	08/12/2024 05:46
Tempo Total de Registro (TTR):	505,0
Tempo Total de Sono (TTS):	413,0
Latência para o início do sono:	27,0
Latência para o sono REM:	119,5
Tempo acordado após o adormecer:	65,0
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	81,8 %

Estágios do Sono					
	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	7,5	213,5	94,0	98,0	92,0
% de TTS	1,8	51,7	22,8	23,7	18,2

Despertares		
	Número	Índice (nº/h)
Total de despertares	56	6,6

Frequência Cardíaca		
	Média [bpm]	Máx [bpm]
REM	64,0	104
NREM	65,7	98
Vigília	72,7	155

Apneias/Hipopneias/RERAs								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	"RERA"	A + H + "RERA"
	Central	Obstrutiva	Mista					
Número	0	1	0	1	61	62	0	62
Índice	0,0	0,1	0,0	0,1	8,9	9,0	0,0	9,0
Índice em REM	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4	0,0	10,4
Índice em NREM	0,0	0,2	0,0	0,2	8,4	8,6	0,0	8,6
Duração máx (seg)	0	19,6	0	19,6	37,5	37,5	0	37,5
Duração média (seg)	0	19,6	0	19,6	22,9	21,3	0	21,3
Índice em Supino	0	0,7	0	0,7	21,7	22,4	0	22,4
Índice em Não Supino	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4	0,0	5,4

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;

- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;

- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 9,0 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 9,0 (nº/h)

DADOS DA OXIMETRIA		
	Média de SAO2	Menor SAO2
Sono:	94%	84%
NREM:	93%	84%
REM:	94%	90%
Vigília:	94%	87%

Valor de oximetria predominante durante o sono: 95%

Total de dessaturações: 62

"PLMS" (Periodic limb movements in sleep) Movimentos periódicos de membros inferiores durante o sono		
EMG tibial bilateral	Número	Índice (nº/h)
"PLMS"	0	0,0
"PLMS" associados a despertares	0	/


DADOS DE BRUXISMO:


TST	<i>Bruxismo</i>
# Ocorrências	0
Index (occurrences/h)	0,0
NREM	<i>Bruxismo</i>
# Ocorrências	0
Index (ocorrência/h)	0,0
REM	<i>Bruxismo</i>
# Ocorrências	0
Index (ocorrência/h)	0,0
VIGÍLIA	<i>Bruxismo</i>
# Ocorrências	0
Index (ocorrência/h)	0,0

POSIÇÃO DE OCORRÊNCIAS DAS APNEIAS:

	REM				
	AC	AO	AM	Hipo	RERA
PRONE	0	0	0	9	0
DIREITO	0	0	0	3	0
ESQUERDO	0	0	0	5	0
SUPINO	0	0	0	0	0
	NREM				
	AC	AO	AM	Hipo	RERA
PRONE	0	0	0	4	0
DIREITO	0	0	0	5	0
ESQUERDO	0	0	0	2	0
SUPINO	0	1	0	32	0

RESUMOS GRÁFICOS:





	Resultados	Valor de normalidade (VN)
Eficiência do sono	81,8 %	≥85%
Latência para o início do sono	27,0 min	até 30 min.
Latência para o sono REM	119,5 min	70 a 120 min.
Percentual do estágio N1	1,8 %	VN= 2% a 5%
Percentual do estágio N2	51,7 %	VN= 45% a 55%
Percentual do estágio N3	22,8 %	VN= 13% a 23%
Percentual do estágio REM	23,7 %	VN= 20% a 25%
Vigília:	18,2 %	5%
Índice de despertares	6,6 (nº/h)	até 15 nº/h
(IDR) Índice de distúrbio respiratório	9,0 (nº/h)	VN= até 5 nº/h 5 a 15 nº/h leve 15 a 30 nº/h moderado > de 30 nº/h elevado).
(PLM) Movimentos periódicos de pernas	0,0 /h	até 15 nº/h