

FRANCISCO RIZZO

MEDICAMENTOS:

SINTOMAS/QUEIXAS

BANHEIRO

HORA QUE ACORDA

HORA QUE DORME

PRATICA EXERCICIO

HORARIO DAS REFEIÇÕES

CAFE:

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTA:

30/11 ~~23~~ ~~24~~ M. de uso: 6h43'

22 Média IAH = 5,2 elv

Fuga = 8.4 elpm

Bem adaptado

Jua.

25/01 P = 10 cmH₂O

23 IAH = 5,5

M. de uso: 6h44'

Fuga = 8.2 elmin.

Bem adaptado

Jua

29/03 P = 10

23 IAH = 3,9 elv

M. de uso: 07hr

Fuga = 11.6 elpm.

isto é infecção urinária e isto acordando muitas vezes.

Jua.

10/05 P = 6,2 - P₉₀ = 7,35.

23 IAH = 1,6 elv

M. de uso: 7.4 elhr.

Relata melhora do sono.

Jua

24/07/23 P = 6,9 cmH₂O

P₉₀ = 6,9 cmH₂O

IAH = 4,5 elh

M. de uso = 6h46'

fuga: 7,2 elmin

Biópsia próstata março/2023
+ infecção bacteriana
Todas ATB IV.

25/09/23 P = 6,1 cmH₂O

P₉₀ = 7,50.

IAH = 4,8 elh

M de uso = 6h

Muito 6 à 10,5
Prm 4 cmH₂O. 6 à 8,5 cmH₂O.

27/11 P = 7,8 cmH₂O

23 IAH = 2,4 elv

M. de uso: 7hr

Fuga = 4.2 elpm.

Bem adaptado, fazendo o 1º prostatectomia

Jua

26/02 P = 7 cmH₂O

24 IAH = 2,4 elv

M. de uso: 6h25'

Bem adapt.

Jua.

27/05/24 $P = 8,5 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1,6 \text{ e/h}$
m. de uso: 7h01m
fuga: 3,2 l/m

Bem adaptado

Natasha

29/07/24 $P = 8,5 \text{ cmH}_2\text{O}$ (mediana)
 $IAH = 1,6 \text{ e/h}$
m. de uso: 6h34'
fuga: 0,6 l/m

Bem adaptado

Natasha

01/10/24 $P = 8,5 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 2,2 \text{ e/h}$
m. de uso: 6h12'

Bem adaptado

Natasha

07/01/2025 $P = 6,2 \text{ cmH}_2\text{O}$ $P_{90} = 7,4 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 2,4 \text{ e/h}$
m. uso = 6h17
fuga: 10 l/min

Bem adaptado

* comprou máquina
Dream Wear (L) * Silenci

11/04/2025 $P = 6,0 \text{ cmH}_2\text{O}$ $P_{90} = 6,9 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1,6 \text{ e/h}$
m. uso = 6h42 min
fuga = 2 l/min

Emagrecer 22Kg

* colocou oxímetro +
silenci

22/04/25
 $P = 5,5 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,8 \text{ e/h}$
m. uso = 6h38
fuga: 0,2 l/min

SpO_2 máx 97%
 SpO_2 média = 92%
 SpO_2 mín = 82%

FC: 91 bpm

FC: 60 bpm

FC: 35 bpm

Silenci

14/07/25 $P = 5,5 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,8 \text{ e/h}$
m. uso = 6h26 min
fuga: 1 l/min

Auto: P. 5 a 7,5 cmH₂O.

sem problemas

Silenci

FRANCISCO SERGIO RIZO	
HD:	
MEDICO:	
MEDICAMENTOS:	
IMC	
CIRCUNF. DE PESCOÇO	
PA:	
OXIMETRIA:	

20/10 P=8
 10/21 IAH=3.4
 m. de uso: 7h
 Relata ressecado na boca — fua

27/10 P=8.25 cmH₂O
 10/21 IAH=4.3
 m. de uso: 6h20' fua

10/11 P=9.20 cmH₂O
 11/21 IAH=5.4
 m. de uso: 6h43'
 Vazão: 13.9 lpm

28/11 P=10 cmH₂O
 21/21 m. de tempo: 6h50'
 Vazão: 22 lpm.
 IAH=4.9 fua

01/02 P=10.
 22/22 molhou o CPAP — fua
 Conseguiu estabelecer func. — fua

22/03 P=10.3
 22/22 IAH=4.8
 m. de uso: 6h20 fua

04/22 P=10.5
 22/22 IAH=5.6
 m. de uso: 6h17'

27/02 P=10.5
 22/22 IAH
 m. de uso:
 Trocou a máscara pela Dream-Fill fua

26/09 P=9.2 cmH₂O
 22/22 IAH=4.4/22 (m. de uso: 6h50')

Nome: FRANCISCO SÉRGIO RIZO

Data de Nascimento: 16-5-1958

IMC: 35,27

Sexo: Masculino

Data do exame: 15-09-2021

Peso: 108 kg

Altura: 1,75 m

Médico: DR. MÁRIO SÉRGIO LEONE

CARREGOSA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 15-09-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 477,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 4,5 e 82,0 minutos. O tempo total de sono foi de 410,5, eficiência de 86,1% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,2%; estágio N2: 52,6%; estágio N3: 22,7%; sono REM: 22,5%. O índice de despertares foi de 13,1/hora (normal < 10/h). O índice de apneia/hipopneia total foi de 19,4/hora, sendo elas 3 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 130 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e mínima de 78%, permanecendo 13,7% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 66 - 90 bpm e NREM de 63 - 93 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (3), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM e porcentagem dos estágios do sono NREM dentro da normalidade;
3. latência para o sono REM diminuída;
4. aumento do número de despertares breves;
5. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (13,0/hora);
6. registro de ronco moderado durante o sono.


Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 10 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.157