

FABIO RODRIGUES LUCIANO

MEDICAMENTOS:

SINTOMAS/QUEIXAS

BANHEIRO

HORA QUE ACORDA

HORA QUE DORME

PRATICA EXERCICIO

HORARIO DAS REFEIÇÕES

CAFE:

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTA:

07/ P= 10,7 cmH₂O

07/ IAH= 3,5 /lv

22 m. de uso: 6h50'

Bem adaptado

fluo

19/08 P= 10,6 cmH₂O

22 IAH= 3,3 /lv

m. de uso: 5h30'

07/06 P= 10,6 cmH₂O

24

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: FABIO RODRIGUES LUCIANO			
Sexo: M	Idade: 35 anos	Peso: 78 Kg	Altura: 1,78 m
IMC: 24,6	Data do Exame: 28/06/2022	Exame: 11801_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 23:13:10 horas e encerrado às 05:48:53 horas, com latência para o sono de 0 minutos e latência para o sono REM de 78 minutos. O tempo total de sono foi de 363,5 minutos, com eficiência do sono de 91,8%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	4,7%	Até 5%
Estágio 2	62,2%	45 - 55%
Estágio 3	15,0%	> 15%
Sono REM	18,2%	20 - 25%
Eficiência do sono	91,8%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 32 minutos ocorreram **217 despertares (índice de 35,8 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 72 bpm, a maior de 89 bpm e a menor de 60 bpm.

Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0,0/hora associados a despertares**.

Ocorreram 364 eventos respiratórios, sendo 0 central e 364 obstrutivos. Sendo 101 apnéias, 263 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 60,1/hora**, sendo 16,7 apnéia/hora e 43,4 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 20,4 e a duração máxima de 43,4.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 65,5/hora, sendo 0,9 apnéia/hora e 64,5 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de 97%, sendo a **saturação média de 93%**, a **maior de 99%** e a **mínima de 78%**, permanecendo 15,6 minutos (3,9%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,1 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 347 dessaturações. Índice de dessaturações: 57,3/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 70,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 54,0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Registro de ronco.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.

Bruno de Andrade Soares
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 104075