

Exame do Sono Biologix

Centro credenciado

Sonofisio - SONOFISIO

Telefone

12 3921-1001

Paciente

Nome Maria Aparecida Mitsue Waki Da Silva
Data de nasc. 30/07/1957 (65 anos)
Sexo Feminino

Exame

Início 17/11/2022 – 22:34:29
Fim 18/11/2022 – 05:33:18
Tempo total 06:58:49 (418,8 min)
Tempo válido 06:42:28 (402,5 min)

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
☐ Congestão nasal
☐ Sedativos
☒ Nenhuma

Tratamentos na noite do exame

- ☐ CPAP
☐ Aparelho de avanço
☒ Nenhum

Questionário do exame

Peso e altura

Respondido em 11/11/2022

Peso 72 kg
Altura 1,47 m
IMC 33,3

Sintomas

Respondido em 11/11/2022


- ☐ Ronco alto e frequente
☐ Dificuldade para manter o sono
☐ Sono agitado
☐ Sono não reparador
☐ Sonolência ou cansaço diurno
☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil
☐ Dificuldade de concentração
☒ Perda de memória
☐ Nenhum

Doenças associadas

Respondido em 11/11/2022

- ☒ Hipertensão arterial sistêmica
☐ Doença arterial coronária
☐ Insuficiência cardíaca
☐ Arritmia cardíaca
☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
☒ Diabetes
☐ Depressão
☐ Refluxo gastroesofágico
☐ Doença respiratória
☐ Nenhuma

Resultado




Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)

IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Compatível com apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Compatível com apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Compatível com apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia tipo IV realizado no dia 17/11/2022, iniciado às 22:34 e terminado às 05:33. O tempo total de registro foi de 6h58min (418 minutos) e o tempo válido foi de 6h42min (402 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 253 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 37,7/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 92% e permaneceu abaixo de 90% durante 16% do tempo de registro (67 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 53% do tempo de registro.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono acentuada (IDO 37,7/hora), nas condições descritas. O tempo com SpO₂ abaixo de 90% é compatível com dessaturação significativa.




Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Nota: considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3 pontos percentuais no nível de saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂). Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 90% durante ao menos 5 minutos com um nadir de 85%. Os índices correspondem ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.

Exame do Sono Biologix

Oximetria (SpO₂)


Histograma SpO₂ (%) × fração do tempo (%)



SpO ₂ mínima	71%
SpO ₂ média	92%
SpO ₂ máxima	98%
Tempo com SpO ₂ < 90%	67,0 min (16%)
Tempo com SpO ₂ < 80%	4,3 min (1%)
Número de dessaturações	253
Índice de dessat. de oxigênio (IDO)	37,7 /hora
Índice de dessat. de oxigênio sono (IDOs)	40,5 /hora
Índice de hipoxemia noturna	0,00 /hora

Frequência Cardíaca (FC)

Histograma FC (bpm) × fração do tempo (%)




FC mínima	48 bpm
FC média	57 bpm
FC máxima	137 bpm

Sono estimado

Tempo total de sono	352,5 min
Tempo para dormir	20,0 min
Tempo acordado pós-sono	44,0 min
Eficiência do sono	84%

Análise de ronco

Tempo de gravação	418,0 min
Tempo com ronco	223,0 min (53%)



Polissonogramas

