

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: MARLENE FARIA CRUZ			
Sexo: F	Idade: 64 anos	Peso: 77 Kg	Altura: 1.60 m
IMC: 30.1	Data do Exame: 17/04/2025	Exame: 00461_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 10:43:16 PM horas e encerrado às 6:02:00 AM horas, com latência para o sono de 8 minutos e latência para o sono REM de 355 minutos. O tempo total de sono foi de 420.5 minutos, com eficiência do sono de 95.5%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	0.6%	Até 5%
Estágio 2	91.0%	45 - 55%
Estágio 3	5.8%	> 15%
Sono REM	2.6%	20 - 25%
Eficiência do sono	95.5%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 11.5 minutos ocorreram **235 despertares (índice de 33.5 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 62 bpm , a maior de 80 bpm e a menor de 55 bpm.

Foram identificados **0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0.0/hora associados a despertares.**


Ocorreram 403 eventos respiratórios, sendo 0 central e 403 obstrutivos. Sendo 389 apnéias, 14 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 57.5/hora**, sendo 55.5 apnéia/hora e 2.0 hipopnéia/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 20.4 e a duração máxima de 34.9.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 54.5/hora, sendo 54.5 apnéia/hora e 0.0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina foi de 94%**, sendo a saturação média de **91%**, a maior de **97%** e a mínima de **81%**, permanecendo 96.1 minutos (21.8%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0.0 minutos (0.0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 404 dessaturações. Índice de dessaturações: **57.6/hora**. Índice de dessaturações no sono REM: **11.0/hora**. Índice de dessaturações no sono Não REM: **59.0/hora**.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuada (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.


 Henrique Pedro Magoga Filho
 Otorrinolaringologia /
 Distúrbios Respiratórios do Sono
 CRM-SP 129264