

NS 227310722

Luis Carlos Pereira

IDADE: 56	PESO: 106	ALTURA: 178	PROFISSÃO: motorista
SINTOMAS: Sonolência após almoço			
QUEIXAS:			
MEDICAMENTOS: Enalapril / Eudalipina / Alopurinol / Siprofibra to / Auroclon / Chavelto / Pantoprazol			
MÉDICO: Dr. Luis Fernando - Dr. Claudio Jd. - Dr. Patrícia			
EXERCÍCIO FÍSICO: caminhada			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5		ALMOÇO: 5	LANCHE: 5 JANTAR:
HORA QUE DORME: 22		HORA QUE ACORDA: 5hr	
COCHILHO (X)SIM ()NÃO		DORME ACOMPANHADO (X)SIM ()NÃO ()EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA ()SIM ()X NA SEMANA (X)NÃO			
FUMO ()SIM ()MAÇO/DIA (X)NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal		BANHEIRO: 2X	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: globosa		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: não	MALLAMPATI:	IAH: 47,2	SPO2:
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:			
CIRURGIAS: (N)NASAL (S)AMIGDALECTOMIA Sinusite / cirurgia Hemiorr. Imb.			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: (N)RESPIRATÓRIA (N)ENDÓCRINA (S)CARDÍACA (N)ORTOPÉDICA (N)NEUROLÓGICA ()OUTROS Aplasia (mês 02)			
03 Avaliação - (5-13 cmH ₂ O)			
01 Mar. D. Wear.			
24			
10/01 P = 10 cmH ₂ O			
24 IAH = 3,8			
m. de uso: 540			
Bem adapt.			
Passo pl P fixa			
24			
25/01 P = 10 cmH ₂ O			
24 IAH = 5,7 e per			
m. de uso = 5h36'			
Ficou bem adaptado, rela- ta melhora da sonolência pois ainda há fobia			
24			
16/02 P = 10 cmH ₂ O			
24 IAH = 7,1			
m. de uso: 6.14hs			
Relata escape ao virar de lado, ouvido higinioso melhor a máscara e o rosto			
Relata ainda sentir sonolência diurna			
Natasha			
01/03 P = 10 cmH ₂ O			
24 IAH = 7,8 e per			
m. de uso: 6h10'			
fuga = 2,9 e pm.			
Relata ainda sonolên- cia diurna			
24			
25/06 P = 11,5 cmH ₂ O			
25 IAH = 18,4 e per			
m. de uso = 6h40'			
Faz cirurgia de catarata			
Dormiu de barriga pl. em			
25			

fua

fua

fua

fua

fua

18/04/24

P = 11 cm H₂O

IAH = 5,3 e/h

m de ura: 6 h

fuga: 5,5 l/m

Bem adaptado
Dorme pouco

Natacha

05/06/24

P = 11 cm H₂O

IAH = 7,2 e/h

m. de ura: 6 h 5 m

fuga: 4,9 l/m

| ↑ 11,5 cm H₂O

Bem adaptado

Dorme decubito dorsal
por causa da coluna.

Natacha

07/08/2024

P = 11,5 cm H₂O

IAH = 2,9 e/h

IH = 2,5

fuga = 4 l/min

m ura = 6 h 03

Bem adaptado

Silvia

09/10/24

P = 11,5 cm H₂O

IAH = 1,3 e/h

m ura: 6 h 03

fuga = 9 l/min

Bem adaptado.

* troca filtro *

Silvia

20/12/24

P = 11,5 cm H₂O

IAH = 1,5 e/h

m de ura: 5 h 58'

fuga: 0

* troca filtro

Natacha

26/03/24

P = 11,5 cm H₂O

IAH = 3,3 e/h

m de ura: 5 h 53'

fuga: 5,7 l/m

* troca filtro

Bem adaptado

5/queixas

Natacha

Nome: LUIS CARLOS PEREIRA	Peso: 106 kg
Data de Nascimento: 7-7-1967	Altura: 1,78 m
IMC: 33,46	Médico: DRA. MARIA LUCIA R. CURY
Sexo: Masculino	PAVAO
Data do exame: 16-10-2023	Medicamentos:
	Histórico:

18/04
24
IAH: 5
um di
f.
05/06/20

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 15-10-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 544,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 22,5 e 179,5 minutos. O tempo total de sono foi de 335,5 min, eficiência de 61,6% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,3%; estágio N2: 75,0%; estágio N3: 7,2%; sono REM: 14,6%. O índice de despertares foi de 24,3/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopnéia total foi de 47,2/hora, sendo 43 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 161 hipopnéias. A SpO2 média foi de 89% e a mínima de 71%, permanecendo 31,8% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 57 - 104 bpm e NREM de 62 - 119 bpm.


CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (06), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 47,2/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=71%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (1,8/hora);
8. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157