

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: EUCLIDES SOUSA LOURENÇO			
Sexo: M	Idade: 43 anos	Peso: 84 Kg	Altura: 1.67 m
IMC: 30.1	Data do Exame: 26/09/2025	Exame: 00995_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 11:48:20 PM horas e encerrado às 6:00:11 AM horas, com latência para o sono de 12 minutos e latência para o sono REM de 287 minutos. O tempo total de sono foi de 359.0 minutos, com eficiência do sono de 95.6%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	2.2%	Até 5%
Estágio 2	72.0%	45 - 55%
Estágio 3	14.6%	> 15%
Sono REM	11.1%	20 - 25%
Eficiência do sono	95.6%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 4 minutos ocorreram **153 despertares (índice de 25.6 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 75 bpm, a maior de 86 bpm e a menor de 66 bpm.

Foram identificados **0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0.0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 242 eventos respiratórios, sendo 0 central e 242 obstrutivos. Sendo 228 apnéias, 14 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 40.5/hora**, sendo 38.1 apnéia/hora e 2.3 hipopnéia/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 17.1 e a duração máxima de 32.4.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 76.5/hora, sendo 76.5 apnéia/hora e 0.0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de **95%**, sendo a saturação **média de 92%**, a **maior de 97%** e a **mínima de 81%**, permanecendo 22.5 minutos (6.0%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0.0 minutos (0.0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 244 dessaturações. Índice de dessaturações: 41.3/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 90.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 35.0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.

Guilherme Salomon de Dominicis
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 130842