



clínica
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO

PSIQUIATRIA

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Certificação em Medicina do Sono
Sociedade Brasileira de Sono
Mestre em Psiquiatria pela UNESP
Cirurgião em Cirurgias de Cabeça e Pescoço
CRM-SP: 69.730

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTES
Medicina do Sono
Cirurgias e Aderências
CRM-SP: 62.858

NOME: Leonardo Ribeiro Dancuart Omar
EXAME nº: 5228
SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
DATA: 27/09/2022
IDADE: 26 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h51min e concluído às 06h34min. A latência para o sono foi de 17 minutos e a latência para o sono REM, de 48 minutos. O tempo total de sono foi de 404,5 minutos (06h44min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 88,1%. A distribuição do sono mostrou 10,3% de estágio 1, 47,1% de estágio 2, 17,7% de estágio 3 e 25% de sono REM. No período total de sono permaneceu 37,5 minutos em vigília, ocorreram 62 microdespertares (índice: 9,2/hora).

O índice de movimentos dos membros inferiores foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 25,1/hora, sendo 1,5 apneia/hora e 23,6 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 25,1/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, sendo a média de 92% e a mínima de 78%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos moderados dos índices de apneia/hipopneia (25,1/hora; índice moderado: 15 a 30/hora) e de distúrbio respiratório (25,1/hora), episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 52; máxima: 74 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a médio.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 17 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava encurtada (48 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (88,1%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (9,2/hora; normal até 15/hora) mantiveram-se nos limites da normalidade – observei o padrão alternante cíclico (PAC) no estágio 2. Houve o aumento da porcentagem do estágio 1 (10,3%; normal: 5%). As porcentagens dos estágios 2 (47,1%; normal: 45-55%), 3 (17,7%; normal: 15-20%) e REM (25%; normal: 20-25%) permaneceram nos limites da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 2 (normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730


Clínica
DR. ALBERTO REMESAR
Psiquiatria do bem-estar


DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Psiquiatria pela UFRJ
Mestre em Psiquiatria pela UFRJ
Doutor em Ciências pela UNIFESP
Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono
CRM 69.730 - RQE 40.178

Leonardo Ribeiro Dancuart Omar

Solicito a locação ou venda do CPAP
para tratar a síndrome da apnéia do sono.
A pressão verificada foi de 5cm H₂O.

Diagn: G47.3

Att,


Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM 69730 - RQE 40178

SJC, 13/10/25.

Avenida Dr. João Guilhermino, 474 - salas 51 e 52
Edifício Office Tower - Centro - São José dos Campos