

27/10
9h

DIACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS 22232865085 | 640

DANILO GIANINI MELIN

IDADE: 36 anos PESO: 80 ALTURA: 1,76 PROFISSÃO: Montador e Estudante
SINTOMAS: Dorco;
QUEIXAS: déficit concentracão; Desânimo; Acorda mto a noite
MEDICAMENTOS: ~~o~~ sonolência diurna.

MÉDICO: Dra. Catuana - Otomuro.

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: ~~o~~

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 23h30' HORA QUE ACORDA: 7h30 8h

COCHILHO (X) SIM () NÃO DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO: 1x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 2,6 e/h SPO2: 80%
nau PSG

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: não.

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

IMC:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA SPO2 84%
(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS

23/09/2024 Análise apn. PSG com CPAP: P: 6,5 cmH2O

comprim CPAP Básico P: 6,6 cmH2O
máx N30: (M)

30/09/24 P = 6,6 cmH2O

IAH = 0,9

M. de uso: 7h52'

Bem adaptado, ainda
deturpando algumas
vezes. Jua

23/10

P = 6,6 cmH2O

IAH = 0,6 e/h

M. de uso: 7h

fuga = 8,1 epm.

TROCOU o travessão.

Jua

30/01

P = 6,6 cmH2O

IAH = 1,1 e/h

fuga = 3,5 epm

m de uso = 6h47'

TROCOU o prong.

Jua

18/02 Faltou

28/04/2025

P = 6,6 cmH2O

IAH = 1,3 e/h

m uso = 6h30min

fuga = 9,1 min.

Bem adaptado.

Silvia

28/07/2025 P: 6,6cm H20

Rampa 5.

uma 21d/30d.

IAH= 1,0e/h
muro= 5h25min
fuga= 7h/min

Sci

Formulário de Anamnese (anamnese) com campos para:

- SINTOMAS
- QUEIXAS
- MEDICAMENTOS
- MÉDICO
- MARCAPASSO
- EXERCÍCIO FÍSICO
- HORÁRIO DAS REFEIÇÕES
- HORA QUE DORME
- COCHILHO
- BEBIDA ALCOÓLICA
- FUMO
- TIPO DE RESPIRAÇÃO
- CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL
- OVERLAP
- PATOLOGIAS ASSOCIADAS
- CIRURGIAS
- HIPOVENTILAÇÃO DA ORELHA
- COMORBIDADE
- ORTOPÉDICA



Clínica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Danilo Gianini Melin

EXAME nº: 5656-2 CPAP

SOLICITADO POR: Dra. Catharina Soares de Andrade

DATA: 12/08/2024

IDADE: 35 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h31min e concluído às 06h07min. A latência para o sono foi de 24 minutos e a latência para o estágio REM, de 114 minutos. O tempo total de sono foi de 369 minutos (06h09min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 80,8%. A distribuição do sono mostrou 17,5% de estágio 1, 58,4% de estágio 2, 13,8% de estágio 3 e 10,3% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 63,5 minutos em vigília, ocorreram 56 microdespertares (índice: 9,1/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 2,6/hora, sendo 0 apneia/hora e 2,6 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 2,6/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 98%, sendo a saturação média de 96% e a mínima de 80%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara nasal Mirage Activa medium (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 6,5 cm de H₂O.

Os índices de apneia/hipopneia (2,6/hora; índice normal: 4/hora) e de distúrbio respiratório (2,6/hora) permaneceram nos limites da normalidade. Registraram-se episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina, despertares e esporádicas extrassístoles. As frequências cardíacas foram: mínima: 62; máxima: 79 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 24 min; normal até 30 min) – ele ingeriu um comprimido de zolpidem 10 mg às 22h08min. A latência para o sono REM estava normal (114 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 80,8%; normal: 85% ou acima), mas o índice de microdespertares (9,1/hora; normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (17,5%; normal: 5%) e 2 (58,4%; normal: 45-55%), e a redução dos estágios 3 (13,8%; normal: 15-16%) e REM (10,3%; normal: 20%).

Sem movimentos periódicos de membros.

Avenida Dr. João Guilhermino, 474, sl 51 e 52

Ed. Office Tower - Centro - São José dos Campos

Tel: (12) 3913-2162 | (12) 3941-2449 | (12) 99622-8008

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69730