

22/10
9:30h

ACOMPANHAMENTO (CONSULTA)
NS 22222628318 | 755

JOAQUIM CARLOS ALVES PEREIRA

IDADE: 65 PESO: 91 ALTURA: 1,80 PROFISSÃO: Aposentado
SINTOMAS: memória / Refluxo.
QUEIXAS: Cansaço / falta de ar / Esquecimento
MEDICAMENTOS: Calcedural / Corum / Hidrocortisona / Repira
fluoxetina 60mg
MÉDICO:
MARCAPASSO: (X)S ()N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: (X)S ()N
EXERCÍCIO FÍSICO: não
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: N
HORA QUE DORME: 20h HORA QUE ACORDA: 6h
COCHILO (X)SIM ()NÃO DORME ACOMPANHADO (X)SIM ()NÃO ()EVENTUAL
BEBIDA ALCOÓLICA ()SIM ()X NA SEMANA (X)NÃO
FUMO ()SIM ()MAÇO/DIA (X)NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: há 40 anos
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 1X
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 39,5 e/h SPO2: 79%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: doença pulmonar / artrose
CIRURGIAS: ()NASAL ()AMIGDALECTOMIA meningite por cisticercose
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:
COMORBIDADE: (X)RESPIRATÓRIA ()ENDÓCRINA ()CARDÍACA
(X)ORTOPÉDICA ()NEUROLÓGICA ()OUTROS

01/04 Avaliação máscara mirage Fx
24

09/04/24 ~~09/04/24~~ P= 6.3cmH₂O Pas: 8.1cmH₂O
Fupar: 19.8 l/min Pas: 40.7 l/min
IAH: 14 e/h (5 e/h antial)
m. de uso: 7h20m

Orientar a colocar microporos na vertical
pl ↓ abertura de boca
↓ umidificação
fixar punção em 6.6cmH₂O Natadha

18/04
24 P= 7.4cmH₂O - Falta de ar
IAH= 11.2 e/h - melhora da dis-
m. de uso: 7h20' - posição
- Dor no peito
- 1x ao banheiro

25/04
24 P= 7.4cmH₂O
IAH= 11.8 e/h
m. de uso: 8m
Fupar= 13.2

13/05 P = 7.4 cmH₂O
24 IAH = 5.5 e/h
m. de uso: 8h20' hr.
fuga = 6.0 lpm.

10/06 P = 7.4 cmH₂O
24 IAH = 5.3 e/h
m. de uso: 8h18'
Fuga = 7.5 lpm.

fus

25/07 P = 7.4 cmH₂O
24 IAH = 4.0 e/h
m. de uso: 8h40'
Fuga = 5.3 lpm.

Bem adaptado.

s/ queixeira.

fus

26/09/24 P = 7.4 cmH₂O
IAH = 7.9 e/h (4.6 central)
m de uso: 7h5'
fuga: 11.6 l/m

Realizarei cirurgia de
folha, está fazendo
uso de medicamento
pl dor

Natasha

29/10/24 P = 7.4 cmH₂O
IAH = 6.5 e/h (3.0 cmH₂O Apneia Central)
m de uso: 8h13'
fuga: 8.7 l/m

Estava colocando
queixeira ao
contrário

Natasha

26/11 P = 7.4 cmH₂O
24 IAH = 6.3 e/h
m de uso: 8h57'
fuga: 6.8 l/m

Natasha

31/01/25 P = 7.4 cmH₂O
IAH = 7.0 e/h
m de uso: 8h22'
fuga: 4.5 l/m

AC: 36
OH = 33

Maxilar estava rasgada

Comprou wisp tecido

Natasha

27/07
25 P = 7.4 cmH₂O
IAH = 7.1 e/h
m. de uso: 6h30'
fuga = ~~6.0~~ 22.4 lpm

↑ 0.6 cmH₂O.

Encaminhamento pl/or. Pedro
pl. Otávio

fus Cláudia

Nome: JOAQUIM CARLOS ALVES PEREIRA
Data de Nascimento: 29-7-1958
IMC: 28,09
Sexo: Masculino
Data do exame: 03-03-2024

Peso: 91 kg
Altura: 1,80 m
Médico: DR. LAURO SIDERATOS
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 03-03-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 545,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 13,5 e 128,5 minutos. O tempo total de sono foi de 473,5 min, eficiência de 86,8% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,9%; estágio N2: 69,0%; estágio N3: 10,7%; sono REM: 17,5%. O índice de despertares foi de 30,6/hora (normal < 10/h).

O índice de apnéia/hipopnéia total foi de 39,5/hora, sendo 34 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 176 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e a mínima de 79%, permanecendo 15,3% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 52 - 88 bpm e NREM de 40 - 87 bpm.


CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (11), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 39,5/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=79%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de atividade em EMG de queixo;
8. registro de ronco durante o sono.

**Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.
Presença de bruxismo ou apertamento.**

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57