

Polissonografia tipo IV de noite inteira
(inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®

Centro credenciado

Sonofisio - SONOFISIO

Telefone

12 3921-1001

Paciente

Nome Joao Batista De Siqueira

Data de nasc. 15/06/1962 (60 anos)

Sexo Masculino

Exame

Início 02/02/2023 – 23:31:04

Fim 03/02/2023 – 06:42:36

Tempo total 07:11:32 (431,5 min)

Tempo válido 07:04:54 (424,9 min)

Condições na noite do exame

☐ Consumo de álcool☐ Congestão nasal☐ Sedativos☒ Nenhuma

Tratamentos na noite do exame

☒ CPAP (07:11)☐ Aparelho de avanço☐ Nenhum

Questionário do exame

Peso e altura

Respondido em 02/02/2023

Peso 80 kg

Altura 1,70 m

IMC 27,7

Sintomas

Respondido em 02/02/2023


☐ Ronco alto e frequente☒ Dificuldade para manter o sono☐ Sono agitado☐ Sono não reparador☒ Sonolência ou cansaço diurno☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil☒ Dificuldade de concentração☐ Perda de memória☐ Nenhum

Doenças associadas

Respondido em 02/02/2023

☒ Hipertensão arterial sistêmica☐ Doença arterial coronária☐ Insuficiência cardíaca☐ Arritmia cardíaca☐ Acidente vascular cerebral (AVC)☐ Diabetes☐ Depressão☐ Refluxo gastroesofágico☐ Doença respiratória☐ Nenhuma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)

IDO < 5 Normal

5 ≤ IDO < 15 Compatível com apneia do sono leve

15 ≤ IDO < 30 Compatível com apneia do sono moderada

IDO ≥ 30 Compatível com apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia tipo IV realizado no dia 02/02/2023, iniciado às 23:31 e terminado às 06:42. O tempo total de registro foi de 7h11min (431 minutos) e o tempo válido foi de 7h04min (424 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 76 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 10,7/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 93% e não permaneceu abaixo de 90% por tempo significativo. Foram detectados eventos de ronco durante 0% do tempo de registro.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono leve (IDO 10,7/hora), nas condições descritas e com o uso de CPAP.

Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1


Nota: considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3 pontos percentuais no nível de saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂). Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 90% durante ao menos 5 minutos com um nadir de 85%. Os índices correspondem ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.

Polissonografia tipo IV de noite inteira (inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®

Oximetria (SpO₂)


Histograma SpO₂ (%) × fração do tempo (%)



SpO ₂ mínima	88%
SpO ₂ média	93%
SpO ₂ máxima	97%
Tempo com SpO ₂ < 90%	4,1 min (0%)
Tempo com SpO ₂ < 80%	0,0 min (0%)
Número de dessaturações	76
Índice de dessat. de oxigênio (IDO)	10,7 /hora
Índice de dessat. de oxigênio sono (IDOs)	8,7 /hora
Índice de hipoxemia noturna	0,00 /hora

Frequência Cardíaca (FC)

Histograma FC (bpm) × fração do tempo (%)




FC mínima	41 bpm
FC média	54 bpm
FC máxima	93 bpm

Sono estimado

Tempo total de sono	350,5 min
Tempo para dormir	28,5 min
Tempo acordado pós-sono	50,5 min
Eficiência do sono	81%

Análise de ronco

Tempo de gravação	430,0 min
Tempo com ronco	1,0 min (0%)



Polissonogramas

