

Exame

Nome	Li Jung Hsien	Nascimento	24/02/1969 (56 anos)	Sexo	Masculino
Início	25/06/2025 - 22:17:00	Tempo total	08:02:00 (482,0 min)		
Fim	26/06/2025 - 06:19:00	Tempo válido	07:53:37 (473,6 min)		

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☐ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☐ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Ficha médica

Medidas corporais

Respondido em 25/06/2025

Peso 79 kg
Altura 1,71 m
IMC 27,0

Medicamentos

Não respondido

- ☐ Nenhum


Sintomas Respondido em 25/06/2025

- ☐ Nenhum
- ☐ Ronco alto e frequente
- ☐ Sonolência excessiva diurna
- ☒ Sono não reparador
- ☒ Despertares frequentes
- ☐ Engasgos noturnos
- ☐ Refluxo gastroesofágico
- ☐ Cefaleia matinal
- ☐ Dificuldade de concentração
- ☒ Perda de memória
- ☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas Respondido em 25/06/2025

- ☐ Nenhuma
- ☒ Hipertensão arterial
- ☐ Diabetes
- ☐ Dislipidemia
- ☐ Câncer
- ☐ Depressão
- ☐ Arritmia cardíaca
- ☐ Infarto agudo do miocárdio
- ☐ Angina
- ☐ Insuficiência cardíaca
- ☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
- ☐ Bronquite / Enfisema
- ☐ Asma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)


IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia realizado no dia 25/06/2025, iniciado às 22:17 e terminado às 06:19. O tempo total de registro foi de 8h02min (482 minutos) e o tempo válido foi de 7h53min (473 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 214 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 27,1/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 91% e permaneceu abaixo de 90% durante 23% do tempo de registro (112 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 80% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono moderada (IDO 27,1/hora), nas condições descritas. O tempo com SpO₂ abaixo de 90% é compatível com dessaturação significativa.


Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1


Notas:

- Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).
- O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
- Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.
- A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).

Exame


Nome	Li Jung Hsien	Nascimento	24/02/1969 (56 anos)	Sexo	Masculino
Início	25/06/2025 – 22:17:00	Tempo total	08:02:00 (482,0 min)		

Oximetria (SpO₂)



SpO ₂ mínima	76%
SpO ₂ média	91%
SpO ₂ máxima	97%
Tempo com SpO ₂ < 90%	112,2 min (23%)
Número de dessaturações ¹	214
Índice de dessaturações de oxigênio (IDO) ^{1,2}	27,1 /hora
Índice de dessat. de oxigênio sono (IDOs)	26,6 /hora
Número de eventos de hipoxemia ³	0
Tempo total em hipoxemia ³	0,0 min (0%)

Frequência cardíaca




Mínima	50 bpm
Média	63 bpm
Máxima	113 bpm

Sono estimado

Tempo total de sono	431,5 min
Tempo para dormir	20,0 min
Tempo acordado pós-sono	28,0 min
Eficiência do sono	90%


Carga hipóxica - Hypoxic burden

Carga hipóxica ⁴	102,0 %.min /hora
-----------------------------	-------------------



Análise de ronco

Tempo de gravação	482,0 min
Tempo com ronco	385,6 min (80%)



Polissonogramas

