

04/11
8h30

NS

MARC LEON ALFRED MEULEMAN

IDADE: 70 PESO: 76 ALTURA: 1,69 PROFISSÃO: Engenheiro mec.
SINTOMAS: Fadiga ao final do dia / Risco - apneia.
QUEIXAS: memória / covid (omicron)
MEDICAMENTOS: Rosuvastatina

EXERCÍCIO FÍSICO: 3x semana (caminhada / Bike) - Pilates 1x

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 19h JANTAR: N

HORA QUE DORME: 00:00 HORA QUE ACORDA: 06:30

COCHILHO (X)SIM ()NÃO 1x. DORME ACOMPANHADO (X)SIM ()NÃO ()EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA (X)SIM ()X NA SEMANA ()NÃO 1 a 2x.

FUMO ()SIM ()MAÇO/DIA (X)NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: (20-28 anos)

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO:

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não

MALLAMPATI: III

IAH: 25,6

SPO2: 85%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: não

CIRURGIAS: (X)NASAL (X)AMIGDALECTOMIA - cirurgia há 60 anos.

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não colesterol

COMORBIDADE: (N)RESPIRATÓRIA (X)ENDÓCRINA (N)CARDÍACA

(N)ORTOPÉDICA (N)NEUROLÓGICA ()OUTROS Cirurg. Hernia Ingu. (3 sem)

13/04/23 Adaptação.

20/04/23 P= 6.

IAH= 13,3 e 1x

m. de uso= 6h 57'

↑ P= 6,5 cmH₂O - Jua

27/04/23 P= 6,4

m. de uso: 6h

IAH= 5,0

Bem adaptado

Jua

16/05/23 P= 6,4 cmH₂O.

↑ 6,6 cmH₂O

m. de uso: 6h

Fuga= 0,0

IAH= 6,0

C= 3,7

IA= 3,0 < 0= 0,2

IH= 3,4

30/06/23 P= 6,6

↓ 6,4 cmH₂O.

IAH= 4,6

Fuga= 0,0

m. de uso: 6h 13'

TROCA TRAVESSICHO Jua

22/08/23

P= 6,4 cmH₂O

IAH= 6,5 (Central 3,0 / IA= 3,4).

m. de uso: 6h 33'

Oriento o uso de mini p/ viagem

Relato dormir de lado.

TROCA filtro

Jua

03/11/23 P=6,4 cmH₂O central: 4,9 e/h tipo=3,4/h.
 IAH=8,5 e/h < substitua: 0,1 e/h
 fuga=13,9 l/min Bem adaptado.
 m de uso=6h 8 min
 P=6,0 cmH₂O

22/01/24 P=6,0 Disposto, relata sarcopenia e
 m. de uso: 6h 24' está utilizando proteína/creatina.
 Fuga=7,4 * Faz entorse do tornozelo.
 IAH=6,0 e/h sua.

27/03/24 P=6,0 * Relata que o entorse está melhor
 IAH=7,4 e/h ↑ P=6,8 cmH₂O
 m. de uso: 6h 9' sua

29/05/24 P=6,8 cmH₂O * ↑ P=7,4 cmH₂O
 IAH=6,7 e/h solicita troca do filtro e máscara
 m. de uso: 6h sua.

28/08/2024 P=7,4 cmH₂O Bem adaptado; sem queixas
 IAH=4,1 e/h (AC: 1,4) Senci
 m de uso: 7h 14' oriento higienização + troca filtro.
 fuga=11 l/min

25/11/24 P=7,4 cmH₂O solicita a troca da máscara no
 IAH=3,2 e/h prong
 m. de uso: 6h
 mediana: 1,6 sua clausão

11/02/25 P=7,4 cmH₂O AC: 2,2 Troca filtro
 IAH=4,5 e/h H: 2,2 Bem adaptada
 m de uso: 6h 25' Natacha
 fuga: 1,8 l/m

15/04/25 P=7,4 cmH₂O Relata estar se sentindo
 IAH=3,2 e/h bem, acorda com deslocamento
 m de uso: 6h 25' da máscara, orienta
 fuga: 2,1 l/m ajustes Natacha

29/07/25 P=7,4 cmH₂O Bem Adaptado.
 IAH=2,6 e/h (AC: 0,0 AC: 0,7) sem queixas
 m de uso: 7h 05' Senci
 fuga=13 l/min

Nome: MARC LEON ALFRED M
 Data de Nascimento: 5-2-195
 IMC: 26,26
 Sexo: Masculino
 Data do exame: 03-07

Exa
 eletrocardiograma
 fluxo e
 eletr

Nome: MARC LEON ALFRED MEULEMAN

Data de Nascimento: 5-2-1953

IMC: 26,26

Sexo: Masculino

Data do exame: 03-08-2022

Peso: 75 kg

Altura: 1,69 m

Médico: DR. MARIO SERGIO LEONE

CARREGOSA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 03-08-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 536,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 15,5 e 116,5 minutos. O tempo total de sono foi de 402,0, eficiência de 74,9% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,5%; estágio N2: 52,9%; estágio N3: 20,6%; sono REM: 23,0%. O índice de despertares foi de 6,9/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 2,5/hora, sendo elas 1 obstrutiva, 0 mistas e 0 centrais e 16 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e a mínima de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 55 - 86 bpm e NREM de 54 - 86 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (14), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e porcentagem dos estágios do sono NREM dentro da normalidade;
3. latências para o sono normais;
4. número de despertares breves normal;
5. presença de atividade em EMG de queixo;
6. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (7,0/hora);
7. registro de ronco moderado durante o sono.


Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 6,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: MARC LEON ALFRED MEULEMAN
Data de Nascimento: 5-2-1953
IMC: 26,26
Sexo: Masculino
Data do exame: 23-06-2022

Peso: 75 kg
Altura: 1,69 m
Médico: DR. MARIO SERGIO LEONE
CARREGOSA
Medicamentos:
Histórico:

Paciente: MARC LEON ALFRED MEULEMAN
Convênio: Unimed
Matrícula: 00044

Relatório m

Paciente
6,0

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 23-06-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 489,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 9,0 e 91,5 minutos. O tempo total de sono foi de 337,5, eficiência de 69,0% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 4,1%; estágio N2: 63,6%; estágio N3: 14,4%; sono REM: 17,9%. O índice de despertares foi de 24,4/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 25,6/hora, sendo elas 26 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 91 hipopnéias. A SpO2 média foi de 95% e mínima de 85%, permanecendo 0,7% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 58 - 77 bpm e NREM de 58 - 84 bpm.


CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (11), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 25,6/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=85%);
5. latências para o sono normais;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de atividade em EMG de queixo;
8. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (30,8/hora);
9. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado associado a distúrbio de movimento.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
Otorrinolaringologia

Paciente: **MARC LEON ALFRED MEULEMAN** (69 anos)
Convênio: **Unimed**
Matrícula: **00044501127001964**

Relatorio medico.

Paciente com indicação de uso de CPAP na pressão titulada de 6,0 cm de H2O

São José dos Campos, 05 de setembro de 2022

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
Otorrinolaringologista
CRM 57.250

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
CRM 57250

SONOFIBRO Aus (claudina ou Paula)

Aus Santa ELZA 4/18

3921 1001

6ª ilhas