

04/11

10h30

THIAGO MAGNUS ZANGRANDI BARBOSA

HD:

MEDICO:

Mario

MEDICAMENTOS:

IMC

CIRCUNF. DE PESÇOÇO

Ciclo ($\pm 7h30'$)

PA:

OXIMETRIA:

IAH: 28,3

22/07, ²¹ ~~22~~ sobrepeso, cl HAS, fez 2PSG p/ titulação
 a pressão de 7cmH₂O ainda restou 18,2/h
 Sugiro a retitulação cl uso de másc. nasal.

29/07

21

P = 10,7 cmH₂O.

IAH = 0,7/h

M. de uso: 7h50' de

Fuga: 15,2 l/min

fua

12/08

21

P = 10,7 cmH₂O

IAH = 1,0

M. de uso: 7h

Fuga: 13,5 l/min.

fua

19/08

21

P = 10,5 cmH₂O.

IAH = 0,8

M. de uso: 7h20'

fua

28/09

21

P = 10,4 cmH₂O.

IAH = 0,9/h

M. de uso: 7h11'

16/11

21

P = 10,5

IAH = 1,0

M. de uso: 7h

fua

20/01

22

P = 10,3

IAH = 0,8

M. de uso 6h45

fua

07/06
22

$P = 8,4$

IAH = 0,6

m. de uso: 6h30'
Bem adaptado, melhora da sonolência,
cansaço. *fua*

Troco o filtro

08/08
22

$P = 8,8 \text{ cmH}_2\text{O}$

IAH = 0,6 l/h

M. de uso: 6h46'

Relata melhora da sonolência e cansaço.

3x semana (25' canulizado / 15 musculação).

Troco o filtro

11/10
22

$P = 9,0 \text{ cmH}_2\text{O}$

IAH = 0,5 l/h

M. de uso: 6h10'

Fuga = 15,6 l/min

fua

20/12
22

$P = 9,0 \text{ cmH}_2\text{O}$

M. de uso: 6h17'

IAH = 0,4 l/h

Fuga = 12,5 l/min

Bem adaptado, relata ainda estar c/
sono (cortina p/ ↓ luz). *fua*

14/02
23

$P = 9,5$ (percentil 95%) - mediana 7,9 cmH₂O.

IAH = 0,4 l/h

M. de uso: 6h45'

Fuga = 13,5 l/min.

(↓ a pressão máx. p/ 9,5 cmH₂O)
fua

16/05
23

$P = 8,2$ (mediana) - P95% = 9,3.

IAH = 0,5 l/h

M. de uso: 6h46'

Bem adaptado

fua

15/08
23

$P = 9,5$ (perc.) - (7,9 mediana)

IAH = 0,5 l/h

M. de uso: 6h50' s/ queixas.

fua

07/11 $P = 9,6 \text{ cmH}_2\text{O}$ / IAH = 0,3 l/h / m. de uso: 6h40'

09/01 24	P = 9.6 cmH ₂ O IAH = 0.4 e/h m. de uso: 6h37' Fuga = 4.6 l/min	Relata estar s/ sintomas. Jua.
21/03 24	P = 7.8 cmH ₂ O percentil 95: 9.4 IAH = 0.6 e/h m. de uso: 6h10m fuga: 8.4 l/min	Bem adaptado Natacha
21/05 24	P = 9.4 cmH ₂ O IAH = 0.6 e/h m. de uso: 6h40' Bem adaptado, nada sintoma — Jua	
30/07 24	P = 8.1 cmH ₂ O (mediana) IAH = 0.3 e/h m de uso: 6h44'	Bem adaptado assintomático S/ queixas Natacha
22/10/24	P = 8.2 cmH ₂ O IAH = 0.6 e/h m de uso: 5h32' fuga: 6.9 l/min	* troca filtro Bem adaptado Natacha
21/01/25	P = 8.5 cmH ₂ O (mediana) IAH = 0.4 e/h m de uso: 5h17' fuga: 11.6 l/min	Relata estar sentindo falta de ar ao iniciar o uso de CPAP ↑ P inicial p/ 7 cmH ₂ O Natacha
29/04/25	P = 9.2 cmH ₂ O IAH = 0.7 e/h m de uso: 6h19 fuga: 22.5 l/min * troca filtro	Bem adaptado S/ queixas Natacha

29/07/2025

$P = 9,3 \text{ cmH}_2\text{O}$

$IAH = 0,5 \text{ x/h}$

$m_{\text{uro}} = 6 \text{ h } 24 \text{ min}$

$\text{fuga} = 16 \text{ l/min}$

Auto 7,6 à 9,6 cmH₂O

Bem adaptado

Silvia

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
Otorrinolaringologia

Paciente: **THIAGO MAGNUS ZANGRANDI BARBOSA** (33
anos)
Convênio: **Petrobras**
Matrícula: **070006546000**

Relatorio medico.

Paciente com SAHOS de grau moderado/ severo com indicação de uso de cpap. Na testagem não conseguiu a rfrividade . Barba muito espessa. Testou com mascara só nasal . Solicito tentativa de adaptação .

São José dos Campos, 20 de julho de 2021

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
Otorrinolaringologista
CRM 57.250

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
CRM 57250

Nome: THIAGO MAGNUS ZANGRANDI BARBOSA

Data de Nascimento: 28-9-1987

IMC: 40,14

Sexo: Masculino

Data do exame: 07-09-2020

Peso: 116 kg

Altura: 1,70 m

Médico: DR. MARIO SERGIO LEONE

CARREGOSA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 07-09-2020, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 518,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 50,5 e 157,5 minutos. O tempo total de sono foi de 435,0, eficiência de 83,9% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,8%; estágio N2: 54,7%; estágio N3: 21,1%; sono REM: 22,3%. O índice de despertares foi de 12,8/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 28,3, sendo elas 120 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 85 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e mínima de 80%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 58 - 103 bpm e NREM de 62 - 103 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (07), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e porcentagem dos estágios do sono NREM dentro da normalidade;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 28,3/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=80%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (4,8/hora);
8. registro de ronco intenso durante o sono.


Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: THIAGO MAGNUS ZANGRANDI BARBOSA

Data de Nascimento: 28-9-1987

IMC: 41,52

Sexo: Masculino

Data do exame: 07-07-2021

Peso: 120 kg

Altura: 1,70 m

Médico: DR. MARIO SERGIO LEONE

CARREGOSA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 07-07-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 404,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 5,0 e 140,5 minutos. O tempo total de sono foi de 368,5, eficiência de 91,2% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,2%; estágio N2: 52,4%; estágio N3: 25,2%; sono REM: 21,2%. O índice de despertares foi de 11,3/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 18,2/hora, sendo elas 15 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 97 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e mínima de 85%, permanecendo 0,4% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 60 - 99 bpm e NREM de 55 - 99 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (06), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N3 do sono NREM aumentada;
3. latência para o sono REM aumentada;
4. aumento do número de despertares breves;
5. registro de ronco intenso durante o sono.


Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 7 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157