
Nome:	JOSE RENATO DE ARAUJO COSTA		
Sexo:	Masculino	Idade:	52 anos
Exame:	35026665	Data:	19/10/2025
Médico Solic.:	LUCIANO AUGUSTO ROTELLA BRAGA		
		Atendimento:	18508958
		ID:	3554562

Conclusão

Exame realizado para titulação de Bilevel, com pressão final de 13x5cmH₂O. A máscara nasal do paciente foi adaptada, mostrando:

Aumento discreto do índice de apneia e hipopneia, eventos obstrutivos, corrigidos com CPAP.

Dessaturação da oxihemoglobina, normalizada com CPAP.

Despertares e ronco corrigidos com a titulação.

Eficiência do sono normal.

Aumento do sono de ondas lentas.

Redução da latência REM.



LUCIANE IMPELLIZIERE LUNA DE MELLO
CRM 98798

Nome: JOSE RENATO DE ARAUJO COSTA

Sexo: M

Idade: 52 anos

Atendimento: 18508958

Peso: 109.0 Kg

Altura: 186.0 cm

IMC: 31.5 Kg/m²

Data: 19/10/2025

Exame: 35026665

ID: 3554562

Médico solicitante: Dr(a). LUCIANO AUGUSTO ROTELLA BRAGA

Laudo de polissonografia: resultado

O exame foi iniciado às 23:20:10 horas e finalizado às 05:33:28 horas. A **latência para o início do sono** foi de 7.0 minutos e a **latência para o início sono REM**, de 11.5 minutos. O **tempo total de sono** (TTS) foi de 322.0 minutos, com **eficiência do sono** de 86.3%. A distribuição dos estágios do sono mostrou 6.2% de **estágio N1**, 37.1% de **estágio N2**, 31.8% de **estágio N3** e 24.8% de **sono REM**. O **tempo de vigília após o adormecer** foi de 44.3 minutos. Ocorreram 84 **despertares**, uma média de 13.8 por hora. O **índice de movimentos periódicos de membros durante o sono** (PLMS – *periodic limb movements in sleep*) foi de 0.0 por hora, sendo 0.0 PLMS por hora **associados a despertares**.

O número total de eventos respiratórios foi de 38, sendo 0 apneias obstrutivas, 4 apneias centrais, 0 apneias mistas, 34 hipopneias obstrutivas, 0 hipopneias centrais e 0 despertares associados a esforço respiratório (RERA – *respiratory effort-related arousal*). O **índice de distúrbio respiratório** (IDR) foi de 7.1 por hora e o **índice de apneia/hipopneia** (IAH), de 7.1 por hora. O **índice de apneia/hipopneia obstrutiva** (IAHO) foi de 6.30 por hora e o **índice de apneia/hipopneia central** (IAHC), de 0.70 por hora.

A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) **basal** foi de 94%; a **média**, 94% e a **mínima**, 87%. O **índice de dessaturação** foi de 15.0 por hora durante o sono REM e 14.9 por hora durante o sono NREM. A saturação permaneceu abaixo de 90% por 0.9% do tempo total de registro.

Índice de distúrbio respiratório (IDR) = índice de apneias + hipopneias + RERA

Procedimento

Exame polissonográfico noturno registrado no sistema Alice 6 LDxS. Foram utilizados parâmetros fornecidos por eletroencefalograma (F4-M1, F3-M2, C4-M1, C3-M2, O2-M1, O1-M2); eletro-oculograma bilateral; eletromiograma (mentoniano/submentoniano e tibial bilateral); eletrocardiograma (montagem D2 modificada); equipamento de PAP (fluxo aéreo); pletismografia por indutância (esforço respiratório torácico e abdominal); oximetria de pulso (saturação percutânea da oxi-hemoglobina – SpO₂); sensor de ronco (microfone) e posição corporal no leito.

Parâmetros de registro recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (2020)

Análise do sono

Data e horário de início	19/10/2025 23:20:10
Data e horário de término	20/10/2025 05:33:28
Tempo total de registro (TTR)	373.3 min
Tempo total de sono (TTS)	322.0 min
Latência para o início do sono	7.0 min
Latência para o sono REM	11.5 min
Tempo em vigília após adormecer	44.3 min
Eficiência do sono (TTS/TTR x 100)	86.3%

Estágios do sono

	N1	N2	N3	REM	Vigília
Duração (min)	20.0	119.5	102.5	80.0	44.0
Distribuição no TTS (%)	6.2	37.1	31.8	24.8	*

Despertares

	Eventos	Índice (por hora)
Total de despertares	84	13.8

Frequência cardíaca

	Média (bpm)	Máxima (bpm)
Total	53.2	64.0
REM	51.7	
NREM	53.7	
Vigília	64.3	

Movimentos periódicos de membros durante o sono (PLMS - *periodic limb movements in sleep*)

EMG tibial bilateral	Eventos	Índice (por hora)
PLMS	0	0.0
PLMS associados a despertares	0	0.0

Parâmetros de análise recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (2020)

Eventos respiratórios

	Total de eventos	Índices (por hora)				Duração (seg)	
		REM	NREM	TTS	Supino	Não supino	Máxima Média
Apneia obstrutiva (AO)	0	0.0	0.0	0.0		0.00	0.0 0.0
Apneia mista (AM)	0	0.0	0.0	0.0		0.00	0.0 0.0
Hipopneia obstrutiva (HO)	34	3.0	6.9	6.3	*	*	28.0 15.4
RERA	0	0	0	0.0		0.00	0.0 0.0
AO+AM+HO	34.00	3.00	6.90	6.30	*	*	28.00 15.40
AO+AM+HO+RERA	34.00	3.00	6.90	6.30	*	*	28.00 15.40
Apneia central (AC)	4	0	3	0.7		0.75	20.5 16.1
Hipopneia central (HC)	0	0.0	0.0	0.0	*	*	0.0 0.0
AC+HC	4.00	0.00	3.00	0.70	*	*	20.50 16.10

Índice de apneia + hipopneia obstrutiva (IAHO): 6.30 (por hora)

IAH(O+C): 7.1 (por hora)

Índice de apneia + hipopneia central (IAHC): 0.70 (por hora)

Índice de hipopneia central e obstrutiva: (por hora) em supino e 6.34 (por hora) em não supino

Índice de distúrbio respiratório (IDR): 7.1 (por hora)

Tempo de respiração de Cheyne-Stokes: 0.00 (min)

Parâmetros de análise recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (2020)

- **Apneia:** queda de 90% do fluxo aéreo medido pelo equipamento de PAP por 10 segundos ou mais.
- **Hipopneia obstrutiva:** queda de 30% do fluxo aéreo por 10 segundos ou mais associada a 3% ou mais de dessaturação ou despertar; presença de movimento paradoxal de caixa torácica, achatamento da curva de fluxo aéreo ou ronco durante o evento.
- **Hipopneia central:** queda de 30% do fluxo aéreo por 10 segundos ou mais associada a 3% ou mais de dessaturação ou despertar; ausência de movimento paradoxal de caixa torácica, achatamento da curva de fluxo aéreo e ronco durante o evento.
- **RERA:** achatamento da curva de fluxo aéreo por 10 segundos ou mais associado a despertar do EEG.
- **Respiração de Cheyne-Stokes:** presença de respiração periódica com padrão crescendo-decrescendo alternado por apneias ou hipopneias centrais, por 40 segundos ou mais.


Saturação da oxi-hemoglobina


Saturação média	94%	Saturação TTR < 90%	0.9% (3.2 min)
Saturação mínima	87%	Saturação REM < 90%	0.1% (0.3 min)
		Saturação NREM < 90%	0.6% (2.2 min)
Saturação média na vigília	95%		
Saturação média no sono REM	95%	Saturação < 80%	0.0% TTR (0.0 min)
Saturação média no sono NREM	94%	Saturação < 70%	0.0% TTR (0.0min)
Total de dessaturações	95		
Índice de dessaturação no sono		15.7 (por hora)	
Índice de dessaturação no sono REM		15.0 (por hora)	
Índice de dessaturação no sono NREM		14.9 (por hora)	

Pressão positiva contínua em vias aéreas – BIPAP

IPAP	EPAP	TTR (min)	TTS (min)	Apneias				Hipopneias		RERAs		IAH	IDR	SpO2 mín
				AC	AO	AM	Índice	H	Índice	RERAs s	Índice			
8	4	4.2	2.0	4	0	0	57.1	0	0.0	0	0.0	57.1	57.1	87
8	5	178.1	157.	0	0	0	0.0	11	3.7	0	0.0	3.7	3.7	89
8	6	22.9	22.6	0	0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	2.6	2.6	91
9	5	24.1	12.6	0	0	0	0.0	5	12.4	0	0.0	12.4	12.4	88
10	5	86.6	84.1	0	0	0	0.0	3	2.1	0	0.0	2.1	2.1	90
11	5	10.1	9.6	0	0	0	0.0	9	53.5	0	0.0	53.5	53.5	92
12	5	30.4	29.4	0	0	0	0.0	4	7.9	0	0.0	7.9	7.9	90
13	5	6.2	4.2	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	92

Hipnograma





Aquisição: 01304489-111604 (DE ARAUJO COSTA, JOSE)

Estado: Novo | Modo de várias instâncias: Ligado | Banco de dados conectado

JOSE RENATO DE ARAUJO COSTA, 3554562, 18508958

