

CARLOS RODOLFO PINTO	
MEDICAMENTOS:	(2) losartana / geladeira 1x dia / Omeprazol
SINTOMAS/QUEIXAS	Sonolência diurna /
BANHEIRO	
HORA QUE ACORDA	Altura = 1.71 Kg.
HORA QUE DORME	Peso = 100 Kg.
	IAH = 10.5 / ev
PRÁTICA EXERCÍCIO	não.
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES	
CAFE:	ALMOÇO: LANCHE: JANTA:
07/07 22	P = 13.9 cmH ₂ O / IAH = 6.1 / ev média = 6 hrs Fuga = 13.5 l/min * pressão inicial: 5 cmH ₂ O Orientei exercício físico. fua
22/07 22	P = 13.7 cmH ₂ O IAH = 5.2 l/min. m. de uso: 7h15' Bem adaptado, melhora da dor de cabeça. PA irá fazer o controle. melhora da sinusite fua
03/09 22	P = 13.7 cmH ₂ O IAH = 4.8 / ev m. de uso: 6h17' Bem adaptado, <u>↓</u> a PA, <u>↓</u> 5Kg fua
03/12 22	P = 13.6 cmH ₂ O IAH = 3.0 e / ev m. de uso: 6h5' Fuga = 2.2 l/min. não está fazendo caminhada fua
26/01 23	P = 13.4 cmH ₂ O IAH = 3.3 e / ev m. de uso: 7hrs Fuga = 2.8 l/min. perdeu peso 84.300kg fua
22/02 23	P = 13.2 cmH ₂ O média IAH = 4.4 m. de uso: 6h30' fua
28/03 23	P = 11.7 cm (mod.) / 13 percentil IAH = 4.3 e / ev m. de 6hr - fuga = 0.8 fua
222 11 024 133 DN 317	
P = 84.300 Kg	

CARLOS RODOLFO PINTO				
SINTOMAS / QUEIXAS	ressaca as vezes SIC espasa.			
MEDICAMENTOS	nenhum			
Faz cochilo 19m por 30'				
HORA QUE DORME :	22hr	HORA QUE ACORDA:	5h30'	
BANHEIRO	0x			
TIPO DE RESPIRAÇÃO	mista (orientei o uso micropore na boca)			
PRATICA EXERCICIO	não faz			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ :		ALMOÇO:	LANCHE:	JANTAR:
IDADE:	PESO:	IAH:	MALLAMPATI:	SPO2:
<u>27/06</u> 23	P = 11.3 m. de uso: 6h40' IAH = 5.5 e/h Peso = <u>82 Kg</u>	Orientei sobre o posicionamento na cama melhora da apnéia e do sibilante.		
<u>21/09</u> 23	P = 11.9 cmH ₂ O IAH = 4.2 e/h m. de uso: 6h 17' ↑ a pressão inicial 4.0 cmH ₂ O	P = <u>86 Kg</u>	fua	
<u>19/12</u> 23	P = 11.4 cmH ₂ O IAH = 5.3 e/h m. de uso: 6h38'	Bem adaptado.	P = 84 Kg.	
<u>02/02/2024</u>	P = 11.5 cmH ₂ O IAH = 5.8 e/h m de uso: 7horas fuga: 3.1 l/min. ↳ máscara d escape / peso foto.	Auto 7 à 12 cmH ₂ O. → Bem adaptado. → Sugiro atividade física → *horo máscara Yuwell N	Peso 83kg	
<u>14/03/24</u>	P = 10.8 cmH ₂ O IAH = 3.2 e/h m. de uso: 6h20' fuga: 2.3 Percentil 95°: 29.1	Bem adaptado	Natasha	
<u>16/05/24</u>	P = 10.8 cmH ₂ O IAH = 2.7 e/h m. de uso: 6h35m fuga: 2.2 l/m	Bem adaptado		
<u>20/01/2025</u>	Natasha			

24/07/24 $P=10,8 \text{ auH}_2\text{O}$
 $IAH=2,8 \text{ e/h}$
m de uso: 6h 40'
fuga: 15 l/m

Bem adaptado
5/ queiras
Natacha

24/09/24 $P=10,8 \text{ auH}_2\text{O}$
 $IAH=2,7 \text{ e/h}$
m de uso: 6h 5.
fuga: 2,2 l/m

Bem adaptado
Natacha

10/01/2025 $P=10,8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH=2,9 \text{ e/h}$
m de uso: 6h 26 min
fuga: 15 l/min.

Bem adaptado

sienci

03/04/25 $P=10,8 \text{ auH}_2\text{O}$
 $IAH=2,5 \text{ e/h}$
m de uso: 6h 5'
fuga: 22,2 l/m

Bem adaptado
5/ queiras

Natacha

03/07/25 $P=10,8 \text{ auH}_2\text{O}$
 $IAH=2,9 \text{ e/h}$
m de uso: 6h 16'
fuga: 14 l/m

Bem adaptado

Natacha

Nome: CARLOS RODOLFO PINTO

Data de Nascimento: 11-6-1975

IMC: 33,38

Sexo: Masculino

Data do exame: 02-09-2019

Peso: 97,6 kg

Altura: 1,71 m

Medico: DRA. ELIANA TOMOMI

SHIMABUKUBO

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 02-09-2019, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 525,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 30,0 e 147,0 minutos. O tempo total de sono foi de 436,5, eficiência de 83,1% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,2%; estágio N2: 65,1%; estágio N3: 8,2%; sono REM: 24,5%. O índice de despertares foi de 61,2/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 101,7, sendo elas 152 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 588 hipopnéias. A SpO2 média foi de 84% e mínima de 64%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 63 - 108 bpm e NREM de 70 - 118 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (22), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 101,7/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (mín. SaO2= 64%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157