

Exame

Nome	Jose Denis Lantyer Marques	Nascimento	20/12/1969 (55 anos)	Sexo	Masculino
Início	04/12/2025 - 23:07:26	Tempo total	06:51:44 (411,7 min)		
Fim	05/12/2025 - 05:59:10	Tempo válido	06:38:36 (398,6 min)		

Condições na noite do exame

- ☒ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☐ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☒ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Ficha médica

Medidas corporais

Respondido em 04/12/2025

Peso 95 kg
Altura 1,70 m
IMC 32,9

Medicamentos

Respondido em 04/12/2025

- ☒ Nenhum


Sintomas Respondido em 04/12/2025

- ☐ Nenhum
- ☒ Ronco alto e frequente
- ☒ Sonolência excessiva diurna
- ☒ Sono não reparador
- ☒ Despertares frequentes
- ☒ Engasgos noturnos
- ☐ Refluxo gastroesofágico
- ☐ Cefaleia matinal
- ☐ Dificuldade de concentração
- ☐ Perda de memória
- ☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas Respondido em 04/12/2025

- ☐ Nenhuma
- ☐ Hipertensão arterial
- ☒ Diabetes
- ☒ Dislipidemia
- ☐ Câncer
- ☐ Depressão
- ☐ Arritmia cardíaca
- ☐ Infarto agudo do miocárdio
- ☐ Angina
- ☐ Insuficiência cardíaca
- ☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
- ☒ Bronquite / Enfisema
- ☒ Asma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)

IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia com polissonogramas realizado no dia 04/12/2025, iniciado às 23:07 e terminado às 05:59. O tempo total de registro foi de 6h51min (411 minutos) e o tempo válido foi de 6h38min (398 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 205 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 30,9/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 91% e permaneceu abaixo de 90% durante 26% do tempo de registro (107 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 62% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono acentuada (IDO 30,9/hora), nas condições descritas e com o uso de CPAP. O tempo com SpO₂ abaixo de 90% é compatível com dessaturação significativa.


Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1


Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).
2. O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
3. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.
4. A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).


Exame

Nome	Jose Denis Lantyer Marques	Nascimento	20/12/1969 (55 anos)	Sexo	Masculino
Início	04/12/2025 - 23:07:26	Tempo total	06:51:44 (411,7 min)		

Oximetria (SpO₂)



Frequência cardíaca




Sono estimado

Tempo total de sono	354,5 min
Tempo para dormir	20,5 min
Tempo acordado pós-sono	34,5 min
Eficiência do sono	86%


Carga hipóxica - Hypoxic burden

Carga hipóxica⁴ 135,4 %.min /hora



Análise de ronco

Tempo de gravação	410,0 min
Tempo com ronco	254,2 min (62%)



Polissonogramas

