

MACOMPANHAMENTO () CONSULTA	
NS 2223 286 5088	21
KLERYSSON WALDOMIRO DA SILVA LEITE	
IDADE: 44	PESO: 90 ALTURA: 1,73 PROFISSÃO: tec. mec.
SINTOMAS: sonolência diurna	#3º turno
QUEIXAS: Perda de concentração	causado / sonolência diurna p/
MEDICAMENTOS: —	
MÉDICO: Dr. Cássia Onofre / Dr. Paulo Cardoso.	
MARCAPASSO: () S (X) N	COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S (X) N
EXERCÍCIO FÍSICO: não faz exerc.	
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S	ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S 00:00
HORA QUE DORME: 6:30	HORA QUE ACORDA: 13:00 - 14:00
COCHILO () SIM (X) NÃO	DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL
BEBIDA ALCOÓLICA (X) SIM () X NA SEMANA () NÃO (FDS)	Pouco a expor riscos
FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:	
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal	BANHEIRO: OX
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: leve ↑	CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: n
OVERLAP: não	MALLAMPATI: III
IAH: 47 IDO	SPO2:
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:	
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA → ds/ alt.	
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não	IMC:
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA	
(N) ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS	Hernia cervical.
15/07	chamusear
24	
23/07/24	P=5-12 cmH ₂ O fixo P=8.5 cmH ₂ O (mediana)
IAH=3.0	
m de uso: 6h 42'	Bem adaptado
fuga: 8.3 l/min	
14/10/24	P=8.6 cmH ₂ O
IAH=3.4 cmH ₂ O (Ac: 1.8)	/ está fazendo natacap 2x semana
m uso: 7h 05'	↓ ≈ 6kg ultimamente
fuga: 7.1 l/min.	ultra aerofagia
	↓ P=8.4 cmH ₂ O Silia
17/10 - Comprou Bônus 510	
18/11/24	P=8.6 cmH ₂ O
IAH=2.9 x 1h	Bem adaptado; infus hernia cervical
m uso= 7h 13 min.	mas dorme Bem.
fuga= 6.1 l/min.	Silia
06/01/24	P=8.6 cmH ₂ O
IAH=2.3 x 1h	Bem adaptado
m uso= 6h 47 min	usar Biologix 03/02
fuga= 3.1 l/min.	Silia

04/02/25

$P = 8,6 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 2,2 \text{ e/h}$
m. de uso: 7h9'
fuga: 3,2 flm

Bem adaptado

Resultado Biologia
ID 3,4

Natália

14/04
25

$P = 8,6 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 1,3 \text{ e/h}$
m. de uso: 6h20'
fuga = 7,4 lpu

Bem adaptado, sem
queixas.

fuo

21/07/25

$P = 8,6 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 2,3 \text{ e/h}$
Fuga: 10,1 lpu
m. de uso: 6:35

* estava c/ congestão nasal.

Ana Cláudia

Polissonografia tipo IV de noite inteira
(inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®

Centro credenciado

centrocor - CENTROCOR

Telefone

12 3923-1755

Paciente

Nome Kleysson Waldomiro da Silva Leite
Data de nasc. 10/12/1979 (44 anos)
Sexo Masculino

Exame

Início 16/05/2024 - 00:37:55
Fim 16/05/2024 - 07:05:55
Tempo total 06:28:00 (388,0 min)
Tempo válido 06:17:17 (377,3 min)

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
☐ Congestão nasal
☐ Sedativos
☒ Nenhuma

Tratamentos na noite do exame

- ☐ CPAP
☐ Aparelho de avanço
☒ Nenhum

Questionário do exame

Peso e altura

Respondido em 16/05/2024

Peso 92 kg
Altura 1,75 m
IMC 30,0

Sintomas



Respondido em 16/05/2024

- ☒ Ronco alto e frequente
☐ Dificuldade para manter o sono
☒ Sono agitado
☐ Sono não reparador
☒ Sonolência ou cansaço diurno
☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil
☒ Dificuldade de concentração
☐ Perda de memória
☐ Nenhum

Doenças associadas
Respondido em 16/05/2024

- ☐ Hipertensão arterial sistêmica
☐ Doença arterial coronária
☐ Insuficiência cardíaca
☐ Arritmia cardíaca
☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
☐ Diabetes
☐ Depressão
☐ Refluxo gastroesofágico
☐ Doença respiratória
☒ Nenhuma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)

IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Compatível com apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Compatível com apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Compatível com apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia tipo IV realizado no dia 16/05/2024, iniciado às 00:37 e terminado às 07:05. O tempo total de registro foi de 6h28min (388 minutos) e o tempo válido foi de 6h17min (377 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 298 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 47,4/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 94% e permaneceu abaixo de 90% durante 5% do tempo de registro (20 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 69% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono acentuada (IDO 47,4/hora), nas condições descritas.

Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Dr. Paulo Cardoso
CRM 142290-SP / RQE 30259

Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3 pontos percentuais no nível de saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂).
2. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 90% durante ao menos 5 minutos com um nadir de 85%.
3. Os índices das notas 1 e 2 correspondem ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
4. A correlação entre o índice de carga hipóxica e risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Ali Azarbarzin et al, 2020).

Ref.: 100-4731895XZ