

Polissonografia de noite inteira (inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®

Centro credenciado

Sonofisio - SONOFISIO

Telefone

+55 12 3921-1001

Paciente

Nome Klerysson Waldomiro da Silva Leite
Nascimento 10/12/1979 (45 anos)
Sexo Masculino

Exame

Início 03/02/2025 - 22:01:06
Fim 04/02/2025 - 07:01:40
Tempo total 09:00:34 (540,6 min)
Tempo válido 08:44:15 (524,3 min)

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☐ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☒ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Ficha médica

Medidas corporais

Respondido em 16/05/2024

Peso 92 kg
Altura 1,75 m
IMC 30,0

Medicamentos

Não respondido

Sintomas

Respondido em 16/05/2024


- ☒ Ronco alto e frequente
- ☒ Sonolência excessiva diurna
- ☐ Sono não reparador
- ☒ Despertares frequentes
- ☐ Engasgos noturnos
- ☐ Refluxo gastroesofágico
- ☐ Cefaleia matinal
- ☒ Dificuldade de concentração
- ☐ Perda de memória
- ☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas

Respondido em 16/05/2024

- ☐ Hipertensão arterial
- ☐ Diabetes
- ☐ Dislipidemia
- ☐ Câncer
- ☐ Depressão
- ☐ Arritmia cardíaca
- ☐ Infarto agudo do miocárdio
- ☐ Angina
- ☐ Insuficiência cardíaca
- ☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
- ☐ Bronquite / Enfisema
- ☐ Asma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)


IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia realizado no dia 03/02/2025, iniciado às 22:01 e terminado às 07:01. O tempo total de registro foi de 9h00min (540 minutos) e o tempo válido foi de 8h44min (524 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 30 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 3,4/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 95% e não permaneceu abaixo de 90% por tempo significativo. Foram detectados eventos de ronco durante 1% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame normal (IDO 3,4/hora), nas condições descritas e com o uso de CPAP.



Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Notas:

- Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).
- O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
- Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.
- A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).


Ref.: 100-3527350YF

Página 1 de 2


Polissonografia de noite inteira (inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®

Oximetria (SpO₂)



Frequência cardíaca




Sono estimado

Tempo total de sono	489,5 min
Tempo para dormir	22,5 min
Tempo acordado pós-sono	26,5 min
Eficiência do sono	91%


Carga hipóxica - Hypoxic burden

Carga hipóxica⁴ 13,5 %.min /hora



Análise de ronco

Tempo de gravação	541,0 min
Tempo com ronco	5,4 min (1%)



Polissonogramas

