

NS 22221549726 DN 356

LUCI MARA PAIOTI

IDADE: 68	PESO: 94	ALTURA: 166	PROFISSÃO: Eng. Civil - Apos.
SINTOMAS: ↑ peso / enjoo / Sonolência / afasia / refluxo.			
QUEIXAS: Pré diabética - Sintome do Pânico 2008 - Labirinto			
MEDICAMENTOS: nenhum. - Hesteatose hepática 2023			
menop. 55a - após 1996 (4 10 kg.)			
EXERCÍCIO FÍSICO: natação (3x) - Hidrog. (3x)			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: N JANTAR: 19			
HORA QUE DORME: 22 - 23		HORA QUE ACORDA: 5h	
COCHILO (X) SIM () NÃO		DORME ACOMPANHADO () SIM (X) NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO			
FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: Sim		BANHEIRO: 1X	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: 39.5	
OVERLAP: não	MALLAMPATI: IV	IAH: 80 e/ev	SPO2:
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Anexo pequeno.			
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: N.			
COMORBIDADE: (X) RESPIRATÓRIA (X) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA			
(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS Pânico 2008.			
18/04	P = autom.	Másc.	
23	Titulação	— Jua	
21/04	falei pelo whats, ela disse que havia		
23	dormido pouco. Jua		
25/04	M. de uso = 4:57 h (100%)		
23	IAH = 2.4 e/ev		
	P = 7.0		
	Relata melhora (sonolência), ausência de refluxo		
	Jua.		
04/05	P = 7.2 cmH ₂ O		
23	IAH = 1.0 e/ev		
	M. de uso: 7h		
	Bem adaptada Jua.		
25/05	P = 7.1 cmH ₂ O		
23	IAH = 1.0 e/ev		
	M. de uso: 6h29'		
	Bem adaptada, sem queixas — Jua		
30/06	P = 7.1 cmH ₂ O		
23	M. de uso: 7h		
	IAH = 1.2 e/ev		
	M. de uso: 6h52'		
	Bem adaptada Jua.		
31/07	P = 7.7 cmH ₂ O		
23	IAH = 0.8 e/ev		
	M. de uso: 6h27'		
	Bem adapt. Jua.		
	urg. catarata Jua.		

28/08 P = 7.7 cmH₂O
23 IAH = 1.0

M. de uso: 5h40'
sem adapt., com zinnite Jua.

16/10 P = 7.7 cmH₂O mediana → 7.1 cmH₂O.

23 IAH = 1.2 e/h

M. de uso: 5h42'

foi viajar e deixou o CPAP. Jua.

23/11 P = 7.5 cmH₂O

23 IAH = 0.6 e/h

M. de uso: 3h54'

fuga = 21.5 l/min.

com crise de ansiedade,
e secreção

TROCO filtro

Jua.

26/01
24

P = 7.5 cmH₂O

IAH = 0.9 e/h

M. de uso: 5h12'

sem adaptada.

Jua.

03/04
24

P = 7.8 cmH₂O

M. de uso: 5h

IAH = 0.6 e/h

Fuga = 9.5 lpm.

Jua.

05/06
24

P = 7.8 cmH₂O

IAH = 0.7 e/h

M. de uso: 5h17'

sem adaptada.

Jua.

07/08
24

P = 7.8

IAH = 0.9 e/h

M. de uso: 6h

Jua.

06/11
2024

P = 7.8 cmH₂O

IAH = 0.7 e/h

m uso = 4 horas

fuga = 10 l/min

nariz congestionado está
dormindo

Silenci

poucas horas

19/02/25 P = 7.7 cmH₂O

IAH = 1.5 e/h

m de uso: 5h20'

fuga: 20.2 l/min

* troco filtro

Bem adaptada

Natasha

CO:
ICAP

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: LUCI MARA PAIOTI		Peso: 95 Kg	Altura: 1,66 m
Sexo: F	Idade: 67 anos	Exame: 00247_01	
IMC: 34,5	Data do Exame: 03/01/2012		
Médico solicitante: Dr. Edson			

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 23:07:39 horas e encerrado às 05:55:43 horas, com latência para o sono de 48 minutos e latência para o sono REM de 341 minutos. O tempo total de sono foi de 136,5 minutos, com eficiência do sono de 33,5%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	10,3%	Até 5%
Estágio 2	78,8%	45 - 55%
Estágio 3	9,2%	> 15%
Sono REM	1,8%	20 - 25%
Eficiência do sono	33,5%	> 85%

No período total de sono permaneceu 271,5 minutos acordado e ocorreram 128 micro despertares (índice de 56,3 /hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 62 bpm., a maior de 73 bpm e a menor de 55 bpm.

Foram identificados 0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora.

Ocorreram 182 eventos respiratórios, sendo 0 central, 182 obstrutivos e 0 misto. O índice de apnéia/hipopnéia total foi 80,0/hora, sendo 9,7 apnéia/hora e 70,3 hipopnéia/hora. O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 72,0/hora, sendo 0,0 apnéia/hora e 72,0 hipopnéia/hora.

A saturação basal da oxihemoglobina foi de 93%, sendo a saturação média de 90%, a maior de 95% e a mínima de 73%, permanecendo 135,5 minutos (33,2%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 1,7 minutos (0,4%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 135 dessaturações.

Resumo dos resultados

1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau severo (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.

2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.

3 - Registro de ronco.

4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).

5 - Eficiência do sono intensamente diminuída devido ao tempo total desperta durante o exame.

* O Índice de Apnéia-hipopnéia foi calculado nos poucos períodos de sono da paciente.

Brund de Andrade Soares
Otorrinolaringologia
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 104075