

BRÁZ HUMBERTO DO CARMO			
MEDICAMENTOS:			
SINTOMAS/QUEIXAS	arritmia / sonolência / lapso de memória		
BANHEIRO	2x		
HORA QUE ACORDA	23		
HORA QUE DORME	7h		IAH = 23.7 P = 7 cmH ₂ O
PRÁTICA EXERCÍCIO	Pilates 2x sem.		
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES			
CAFE: 7:30	ALMOÇO: 12	LANCHE: 16	JANTA: 19
06/09 P = 7 cmH ₂ O			
22	IAH = 4.3 l/h		Fuga = 30 l/min
M. de uso: 7h41'			
Bem adaptado ajustei a máscara em 03/09			
fua			
20/09 P = 7 cmH ₂ O			
22	IAH = 2.4 l/h		
M. de uso: 7h50'			
Bem adaptado, com queixa de ronco leve			
fua			
19/10 P = 7 cmH ₂ O			
22	IAH = 2.8 l/min		
M. de uso: 6h13'			
Bem adaptado sem queixas			
Bem ajustado.			
fua			
22/11 P = 7 cmH ₂ O			
22	IAH = 2.5 l/h		
M. de uso: 6h49'			
Bem adaptado, 6/ queixas de ressec.			
fua			
24/01 P = 7 cmH ₂ O			
23	IAH = 3.5 l/h		utilizou saliva artif.
Fuga = 26.4 l/min.			
M. de uso: 7h			
Bem adaptado, não tem (+) sonolência			
Sem ronco, troco o filtro			
fua			
28/03 P = 7 cmH ₂ O			
23	IAH = 4.2 l/h		utiliza a saliva
M. de uso: 6h20'			
Fuga = 30.9 l/min			
artificial			
fua			
15/05 P = 7 cmH ₂ O			
24	IAH = 3.3 l/h		
M. de uso: 6h23'			
fua.			

19/06 P = 7 cm H₂O

24 IAH = 7.1 e/h

m. de uso: 7hr

Fuga: 39.8 lpm.

melhora da secreção na boca.

Jua

25/06
25

P = 7 cm H₂O

IAH = 7.3 e/h

m. de uso: 8h

fuga = 32 lpm.

troco o prong da masc. D. wear.

Jua cláudio

12/11
25

P = 7 cm H₂O

IAH = 2.2 e/h

m. de uso: 7hr

30/ 23d de uso

Fuga: 35,9

troco o fixador e fuga filtro.



Brás Humberto do Carmo

Solicito o aluguel ou venda do CPAP
para o tratamento da síndrome da apnéia
do sono.

Máscara ^{facial} ~~nasal~~ utilizada: Mirage

Quattro large (Resmed®)

Pressão: 7cm H₂O.

Possível uso de umidificador.

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69730

SJC, 24/8/22

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

Nome: BRÁZ HUMBERTO DO CARMO

Data de Nascimento: 21-2-1951

IMC: 23,63

Sexo: Masculino

Data do exame: 18-05-2022

Peso: 80 kg

Altura: 1,84 m

Médico: DR. GLAUCO T FERNANDES DE SA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 18-05-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 499,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 152,5 e 80,5 minutos. O tempo total de sono foi de 230,5, eficiência de 46,1% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,0%; estágio N2: 59,2%; estágio N3: 24,1%; sono REM: 14,8%. O índice de despertares foi de 8,0/hora (normal < 10/h).

O índice de apnéia/hipopnéia total foi de 23,7/hora, sendo elas 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 90 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e mínima de 76%, permanecendo 8,5% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 54 - 88 bpm e NREM de 53 - 84 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (7), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem dos estágios N2 e N3 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 23,7/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=76%);
5. latência para o sono aumentada e latência para o sono REM diminuída;
6. número de despertares breves normal;
7. registro de ronco moderado durante o sono.


Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 5757



DR. ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTES

CRM-SP 69730

CRM-SP 62858

NOME: Brás Humberto do Carmo

EXAME nº: 5184 CPAP

SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez

DATA: 25/07/2022

IDADE: 71 anos

Comentários:

Exame iniciado às 23h35min e concluído às 06h35min. A latência para o sono foi de 15 minutos e a latência para o estágio REM, de 167 minutos. O tempo total de sono foi de 396,5 minutos (06h36min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 94,1%. A distribuição do sono mostrou 3,3% de estágio 1, 90,5% de estágio 2, 0% de estágio 3 e 6,2% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 10 minutos em vigília, ocorreram 30 microdespertares (Índice: 4,5/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 9,8/hora, sendo 0,8 apneia/hora e 9,1 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 9,8/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 92%, sendo a saturação média de 91% e a mínima de 81%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara facial Mirage Quattro large (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 7 cm de H₂O.

Registraram-se aumentos leves dos índices de apneia/hipopneia (9,8/hora; índice leve: 5 a 15/hora) e de distúrbio respiratório (9,8/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina e arritmia cardíaca (taqui-bradicardias). As frequências cardíacas foram: mínima: 53; máxima: 82 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 15 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (167 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (94,1%; normal: 85% ou acima) e o índice microdespertares (4,5/hora; normal até 15/hora) mantiveram-se nos limites da normalidade. Houve o aumento da porcentagem do estágio 2 (90,5%; normal: 45-55%) e a redução dos estágios 1 (3,3%; normal: 8-10%) e REM (6,2%; normal: 20%). Ausência do estágio 3 (0%; normal: 10-12%).

Sem movimentos periódicos de membros (0/hora; índice normal até 15/hora).
Escala de Sonolência de Epworth: 4 (normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730