

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: INES TERESINHA MADRIL

Sexo: Feminino

Data do Exame: 25-09-2025

Idade: 58 anos

Peso: 67 kg

Altura: 1,58 m

Médico Solicitante: DR. LUCIANO AUGUSTO ROTELLA
BRAGA

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 25/09/2025 22:06 e finalizado às 26/09/2025 05:50.

A latência para início do sono foi de --- min e a latência para o sono REM de **151,5** min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 411,0 min, com eficiência do sono de **88,4** %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **2,4** % de estágio N1, **60,8** % de estágio N2, **12,3** % de estágio N3 e **24,5** % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 54,0 min. Ocorreram 225 despertares, sendo o índice de **29,0 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 316, sendo 6 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 310 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **46,1 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 49,6 e o IDR durante o sono NREM foi de 45,0. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 46,1 (nº/h), sendo 0,9 apneia/h e 45,3 hipopneia/h.

A **saturação da oxi-hemoglobina** (SAO₂) **basal** foi 94%, a **média** de 92% e a **mínima** de 76%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (**IDO**) foi de 40,2 (nº/h), sendo que em REM foi de 50,1 (nº/h) e em NREM foi de 44,1 (nº/h). Permaneceu 9,2 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (4), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório acentuado (**46,1 n°/h**) (VN= até 5 n°/h);
2. Dessaturação da oxi-hemoglobina (**76%**);
3. Latência para o início do sono diminuída (**0,0 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Aumento da latência para o início do sono REM (**151,5 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono preservada (**88,4 %**) (VN= $\geq 85\%$);
6. Aumento do índice de despertares (**29,0 n°/h**) (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 normal (**2,4 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Aumento do percentual do estágio N2 (**60,8 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Diminuição do percentual do estágio N3 ondas delta (**12,3 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM normal (**24,5 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco leve, constante verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA


Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

DADOS DO PACIENTE:

Nome: INES TERESINHA MADRIL

ID: 0

Altura: 1,58 m

Peso: 67 kg

Sexo: Feminino

Data de Nascimento: 6-4-1967

IMC: 26,84

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 22:06:17

Data do Exame: 25-09-2025

Médico Solicitante: DR. LUCIANO AUGUSTO ROTELLA BRAGA

Análise do Sono	
Data/Horário de Início:	25/09/2025 22:06
Data/Horário de Término:	26/09/2025 05:50
Tempo Total de Registro (TTR):	465,0
Tempo Total de Sono (TTS):	411,0
Latência para o início do sono:	---
Latência para o sono REM:	151,5
Tempo acordado após o adormecer:	54,0
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	88,4 %

Estágios do Sono					
	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	10,0	250,0	50,5	100,5	54,0
% de TTS	2,4	60,8	12,3	24,5	11,6

Despertares		
	Número	Índice (nº/h)
Total de despertares	225	29,0

Frequência Cardíaca		
	Média [bpm]	Máx [bpm]
REM	61,2	76
NREM	62,3	80
Vigília	67,9	91

Apneias/Hipopneias/RERAs								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	“RERA”	A + H + “RERA”
	Central	Obstrutiva	Mista					
Número	0	6	0	6	310	316	0	316
Índice	0,0	0,9	0,0	0,9	45,3	46,1	0,0	46,1
Índice em REM	0,0	0,0	0,0	0,0	49,6	49,6	0,0	49,6
Índice em NREM	0,0	1,2	0,0	1,2	43,9	45,0	0,0	45,0
Duração máx (seg)	0	27,4	0	27,4	44,0	44,0	0	44,0
Duração média (seg)	0	19,8	0	19,8	22,4	21,1	0	21,1
Índice em Supino	0	0	0	0	75,6	75,6	0	75,6
Índice em Não Supino	0,0	0,9	0,0	0,9	43,2	44,1	0,0	44,1

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;

- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;

- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 46,1 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + “RERA”): 46,1 (nº/h)

DADOS DA OXIMETRIA		
	Média de SAO2	Menor SAO2
Sono:	92%	76%
NREM:	92%	83%
REM:	93%	76%
Vigília:	94%	85%

Valor de oximetria predominante durante o sono: 94%


Total de dessaturações: 312


"PLMS" (Periodic limb movements in sleep) Movimentos periódicos de membros inferiores durante o sono		
EMG tibial bilateral	Número	Índice (nº/h)
"PLMS"	0	0,0
"PLMS" associados a despertares	0	/

POSIÇÃO DE OCORRÊNCIAS DAS APNEIAS:

	REM				
	AC	AO	AM	Hipo	RERA
PRONE	0	0	0	15	0
DIREITO	0	0	0	0	0
ESQUERDO	0	0	0	68	0
SUPINO	0	0	0	0	0
	NREM				
	AC	AO	AM	Hipo	RERA
PRONE	0	1	0	67	0
DIREITO	0	0	0	0	0
ESQUERDO	0	2	0	123	0
SUPINO	0	0	0	17	0

RESUMOS GRÁFICOS:





	Resultados	Valor de normalidade (VN)
Eficiência do sono	88,4 %	≥85%
Latência para o início do sono	--- min	até 30 min.
Latência para o sono REM	151,5 min	70 a 120 min.
Percentual do estágio N1	2,4 %	VN= 2% a 5%
Percentual do estágio N2	60,8 %	VN= 45% a 55%
Percentual do estágio N3	12,3 %	VN= 13% a 23%
Percentual do estágio REM	24,5 %	VN= 20% a 25%
Vigília:	11,6 %	5%
Índice de despertares	29,0 (nº/h)	até 15 nº/h
(IDR) Índice de distúrbio respiratório	46,1 (nº/h)	VN= até 5 nº/h 5 a 15 nº/h leve 15 a 30 nº/h moderado > de 30 nº/h elevado).
(PLM) Movimentos periódicos de pernas	0,0 /h	até 15 nº/h