

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: FILIPPE FERNANDES COSENZA

Sexo: Masculino

Data do Exame: 01-07-2025

Idade: 38 anos

Peso: 79 kg

Altura: 1,77 m

Médico Solicitante: DR. PEDRO HENRIQUE DE ABREU
MACEDO

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 01/07/2025 21:43 e finalizado às 02/07/2025 05:47.

A latência para início do sono foi de **96,5** min e a latência para o sono REM de **114,0** min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 336,0 min, com eficiência do sono de **69,3 %**.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **2,5 %** de estágio N1, **53,3 %** de estágio N2, **21,0 %** de estágio N3 e **23,2 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 52,5 min. Ocorreram 105 despertares, sendo o índice de **13,0 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **8,9 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 102, sendo 24 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 78 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **18,2 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 33,8 e o IDR durante o sono NREM foi de 13,5. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 18,2 (nº/h), sendo 4,3 apneia/h e 13,9 hipopneia/h.

A **saturação da oxi-hemoglobina** (SAO₂) **basal** foi 95%, a **média** de 94% e a **mínima** de 87%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (**IDO**) foi de 12,2 (nº/h), sendo que em REM foi de 33,8 (nº/h) e em NREM foi de 12,8 (nº/h). Permaneceu 0,4 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (13), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório moderado (**18,2 n°/h**) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação da oxi-hemoglobina (**87%**);
3. Aumento da latência para o início do sono (**96,5 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM normal (**114,0 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono reduzida (**69,3 %**) (VN= $\geq 85\%$);
6. Índice de despertares normal (**13,0 n°/h**) (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 normal (**2,5 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 normal (**53,3 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta normal (**21,0 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM normal (**23,2 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco verificado via sensor de ronco;
12. Presença de movimento periódico de membros inferiores com índice normal (8,9 (n°/h) (VN= até 15 n°/h);

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

DADOS DO PACIENTE:

Nome:	FILIPPE FERNANDES COSENZA
ID:	0
Altura:	1,77 m
Peso:	79 kg
Sexo:	Masculino
Data de Nascimento:	23-1-1987
IMC:	25,22

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame:	21:43:08
Data do Exame:	01-07-2025
Médico Solicitante:	DR. PEDRO HENRIQUE DE ABREU MACEDO

Análise do Sono	
Data/Horário de Início:	01/07/2025 21:43
Data/Horário de Término:	02/07/2025 05:47
Tempo Total de Registro (TTR):	485,0
Tempo Total de Sono (TTS):	336,0
Latência para o início do sono:	96,5
Latência para o sono REM:	114,0
Tempo acordado após o adormecer:	52,5
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	69,3 %

Estágios do Sono					
	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	8,5	179,0	70,5	78,0	149,0
% de TTS	2,5	53,3	21,0	23,2	30,7

Despertares		
	Número	Índice (nº/h)
Total de despertares	105	13,0

Frequência Cardíaca		
	Média [bpm]	Máx [bpm]
REM	65,2	92
NREM	67,6	92
Vigília	79,8	109

Apneias/Hipopneias/RERAs								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	"RERA"	A + H + "RERA"
	Central	Obstrutiva	Mista					
Número	0	24	0	24	78	102	0	102
Índice	0,0	4,3	0,0	4,3	13,9	18,2	0,0	18,2
Índice em REM	0,0	6,2	0,0	6,2	27,7	33,8	0,0	33,8
Índice em NREM	0,0	3,7	0,0	3,7	9,8	13,5	0,0	13,5
Duração máx (seg)	0	31,3	0	31,3	48,0	48,0	0	48,0
Duração média (seg)	0	19,4	0	19,4	21,7	20,5	0	20,5
Índice em Supino	0	0	0	0	0	0	0	0
Índice em Não Supino	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;

- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;

- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 18,2 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 18,2 (nº/h)

DADOS DA OXIMETRIA		
	Média de SAO2	Menor SAO2
Sono:	94%	87%
NREM:	94%	88%
REM:	94%	87%
Vigília:	95%	90%

Valor de oximetria predominante durante o sono: 95%

Total de dessaturações: 99


"PLMS" (Periodic limb movements in sleep) Movimentos periódicos de membros inferiores durante o sono		
EMG tibial bilateral	Número	Índice (nº/h)
"PLMS"	0	0,0
"PLMS" associados a despertares	0	/

DADOS DE BRUXISMO:

TST	<i>Bruxismo</i>
# Ocorrências	0
Index (occurrences/h)	0,0
NREM	<i>Bruxismo</i>
# Ocorrências	0
Index (ocorrência/h)	0,0
REM	<i>Bruxismo</i>
# Ocorrências	0
Index (ocorrência/h)	0,0
VIGÍLIA	<i>Bruxismo</i>
# Ocorrências	0
Index (ocorrência/h)	0,0

RESUMOS GRÁFICOS:





	Resultados	Valor de normalidade (VN)
Eficiência do sono	69,3 %	≥85%
Latência para o início do sono	96,5 min	até 30 min.
Latência para o sono REM	114,0 min	70 a 120 min.
Percentual do estágio N1	2,5 %	VN= 2% a 5%
Percentual do estágio N2	53,3 %	VN= 45% a 55%
Percentual do estágio N3	21,0 %	VN= 13% a 23%
Percentual do estágio REM	23,2 %	VN= 20% a 25%
Vigília:	30,7 %	5%
Índice de despertares	13,0 (nº/h)	até 15 nº/h
(IDR) Índice de distúrbio respiratório	18,2 (nº/h)	VN= até 5 nº/h 5 a 15 nº/h leve 15 a 30 nº/h moderado > de 30 nº/h elevado).
(PLM) Movimentos periódicos de pernas	0,0 /h	até 15 nº/h