

ELISEU ANTONIO TOSETTO NETO

SINTOMAS / QUEIXAS: Insônia / cansaço / Refluxo gástrico / HAS.
MEDICAMENTOS: Patz / Acetaminof / Colesterol.

HORA QUE DORME: 23:00 HORA QUE ACORDA: 6:30
BANHEIRO: 1-3x
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal
PRÁTICA EXERCÍCIO: Parou há 5 meses 19hs
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: sim ALMOÇO: sim LANCHE: sim JANTAR:
IDADE: 68 anos PESO: 83 IAH: 24.8 MALLAMPATI: 2 SPO2: 80%.

16/01 De 4 a 5 anos, não consegue dormir direito, tem insônia.
Usa AIO, teve problema na ATM.

23/01 P = 7.0 cmH₂O refluxo dia 19/01
23 IAH = 1.7 e/ev
m. de uso: 6h 18'
umidif. 5. fua.

13/02 P = 7.0 cmH₂O - Bem adaptado
23 IAH = 0.9 e/ev - Cansaço ↓
m. de uso: 8h
fuga: 1.0 e/ev. fua.

09/03 P = 7.0 cmH₂O Bem adaptado
23 IAH = 0.7 e/ev
m. de uso: 7h 40'
usa Patz. fua.

11/4/23 P = 6.0 cmH₂O.
m. de uso: 8h
IAH = 1.0.

10/05/23 P = 6.0 cmH₂O
IAH = 1.0 e/ev
m. de uso: 7h 30'
Diminui os medicamentos

23/06 P = 7.0 cmH₂O trocar o filtro
23 IAH = 1.1 e/ev
m. de uso: 7h 45'
Bem adaptado, ↓ medicamentos fua.

24/08 P = 7.0 cmH₂O
23 IAH = 1.2 e/ev
m. de uso: 7h 45' fua.

Nome: ELISEU ANTONIO TOSETTO NETO
Data de Nascimento: 13-1-1955
IMC: 28,73
Sexo: Masculino
Data do exame: 20-11-2022

Peso: 85 kg
Altura: 1,72 m
Médico: DR. EDUARDO BRANDAO
ELKHOURY
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 20-11-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 489,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 55,5 e 186,5 minutos. O tempo total de sono foi de 242,5 min, eficiência de 49,5% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 4,3%; estágio N2: 53,8%; estágio N3: 24,5%; sono REM: 17,3%. O índice de despertares foi de 6,6/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 18,8/hora, sendo 51 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 25 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e a mínima de 87%, permanecendo 1,7% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 49 - 73 bpm e NREM de 48 - 77 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (10), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N3 do sono NREM aumentada;
3. latências para o sono prolongadas;
4. número de despertares breves normal;
5. registro de ronco durante o sono.


Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 8,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: ELISEU ANTONIO TOSETTO NETO			
Sexo: M	Idade: 64 anos		
IMC: 28,4	Data do Exame: 18/12/2019	Peso: 84 Kg	Altura: 1,72 m
Médico solicitante: JOSE MAURO		Exame: 10347_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às **20:19:08** horas e encerrado às **06:02:23** horas, com **latência para o sono de 168 minutos** e **latência para o sono REM de 309 minutos**. O tempo total de sono foi de 325,0 minutos, com **eficiência do sono de 55,6%**. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1,5%	Até 5%
Estágio 2	74,6%	45 - 55%
Estágio 3	15,2%	> 15%
Sono REM	8,6%	20 - 25%
Eficiência do sono	55,6%	> 85%

No período total de sono permaneceu 259,5 minutos acordado e ocorreram **137 micro despertares (índice de 25,3 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 58 bpm, a maior de 91 bpm e a menor de 50 bpm.

Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora**.

Ocorreram 133 eventos respiratórios, sendo 0 central, 133 obstrutivos e 0 misto. O **índice de apnéia/hipopnéia total foi 24,6/hora**, sendo 2,8 apnéia/hora e 21,8 hipopnéia/hora. O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 53,6/hora, sendo 17,1 apnéia/hora e 36,4 hipopnéia/hora.

A saturação basal da oxihemoglobina foi de 95%, sendo a saturação média de 92%, a maior de 99% e a mínima de 84%, permanecendo 13,7 minutos (2,3%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,0 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 130 dessaturações.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau moderada (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Registro de ronco.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono reduzida.

Guilherme Salomón De Dominicis
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 130842