

NS 22221744634 DN025

JOSE CARLOS FOGAÇA

IDADE:	PESO:	ALTURA:	PROFISSÃO:
SINTOMAS: <i>Sondencia e cansaço</i>			
QUEIXAS:			
MEDICAMENTOS: <i>Alcetimiv (CA) / Xigdu / Oloprox / Hexomepra- 700</i>			
EXERCÍCIO FÍSICO: <i>sim / mas fez cirurgia ombro (D).</i>			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: <i>S</i> ALMOÇO: <i>S</i> LANCHE: <i>S</i> JANTAR: <i>S</i>			
HORA QUE DORME: <i>22:30</i>		HORA QUE ACORDA: <i>6:30</i>	
COCHILHO ☒ SIM () NÃO <i>1h30</i>		DORME ACOMPANHADO ☒ SIM () NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA ☒ SIM () X NA SEMANA () NÃO <i>7x semana (cerveja)</i>			
FUMO () SIM () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: <i>Ex fumante</i>			
TIPO DE RESPIRAÇÃO:		BANHEIRO: <i>(1x5x)</i>	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP:	MALLAMPATI: <i>IV</i>	IAH: <i>29,7</i>	SPO2:
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:			
CIRURGIAS: () NASAL ☒ AMIGDALECTOMIA <i>obstrução nasal</i>			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA			
(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS			
<i>05/06 P= 6cmH₂O</i>			
<i>23 IAH= 2.9 e/ev</i>			
<i>M. de uso: 7h50'</i>			
<i>Bem adaptado — fua.</i>			
<i>03/07/23 P= 6cmH₂O</i>			
<i>m de uso: 7h45'</i>			
<i>IAH= 2.7 e/ev</i>			
<i>fuga= 12.4 l/min</i>			
<i>*interesse em locar Airmin em setembro</i>			
<i>24/08 P= 6cmH₂O</i>			
<i>23 IAH= 3.7 e/ev</i>			
<i>M. de uso: 15.4 l/min</i>			
<i>Fuga= 17 l/min</i>			
<i>fua</i>			
<i>12/09 P= 6cmH₂O</i>			
<i>23 m. de uso: 8h</i>			
<i>Fuga= 20.3</i>			
<i>IAH= 3.3 e/ev</i>			
<i>fua.</i>			
<i>17/01 P= 6cmH₂O</i>			
<i>25 IAH= 5.8 e/ev</i>			
<i>M. de uso:</i>			
<i>teco filtro.</i>			
<i>fua</i>			
<i>28/11/25 Config Airmin</i>			



INSTITUTO DO SONO-AFIP

EXAME DE POLISSONOGRAFIA

PACIENTE: JOSÉ CARLOS FOGAÇA
IDADE: 61 anos DATA: 22/7/2008

No. EXAME: 1229

COMENTÁRIOS:

Exame tendo início às 22:22:34 horas e término às 05:39:34 horas, com latência para o sono de 22.0 minutos e latência para o sono REM de 65.5 minutos. O tempo total de sono foi de 236.0 minutos, com eficiência do sono de 54.0%. A distribuição do sono mostrou 6.8% de estágio 1, 58.3% de estágio 2, 3.8% de estágio 3, 18.9% de estágio 4 e 12.3% de sono REM. No período total de sono permaneceu 199.5 minutos em estágio 0, ocorreram 138 despertares breves (índice de despertar : 35.6 n°/h).

O índice de PLM foi de : n°/h

O índice de apnéia/hipopnéia foi 29.7/hora, sendo 19.1 apnéia/hora e 10.7 hipopnéia/hora. O número de eventos respiratórios foi de 117. Sendo 42 Hipopnéias, 75 apnéia obstrutivos, 0 centrais e 0 mistos. A duração máxima foi de 54.5 segundos. A saturação média foi de 93%, sendo a mínima de 85%.

CONCLUSÃO:

1. Ronco alto e intermitente;
2. Índice de apnéia e hipopnéia acentuadamente elevado;
3. Dessaturação intensa da oxi-hemoglobina;
4. Eficiência do sono reduzida;
5. Períodos prolongados em vigília no decorrer da noite;
6. Redução do sono REM;
7. Despertares freqüentes.

Dra: Lia Bittencourt
CRM: 62888