

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: ANTONIO CARLOS RIBEIRO DO VALLE

Sexo: Masculino

Data do Exame: 14-08-2025

Idade: 73 anos

Peso: 85 kg

Altura: 1,75 m

Médico Solicitante: DR. ANTONIO CARLOS ZAMPA

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 14/08/2025 22:20 e finalizado às 15/08/2025 05:45.

A latência para início do sono foi de **4,0 min** e a latência para o sono REM de **123,0 min**.

O tempo total de sono (TTS) foi de 313,5 min, com eficiência do sono de **70,6 %**.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **2,4 %** de estágio N1, **55,0 %** de estágio N2, **20,6 %** de estágio N3 e **22,0 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 126,5 min. Ocorreram 61 despertares, sendo o índice de **8,2 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **9,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 18, sendo 0 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 18 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **3,4 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 4,3 e o IDR durante o sono NREM foi de 3,2. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 3,4 (nº/h), sendo 0,0 apneia/h e 3,4 hipopneia/h.

A **saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂)** basal foi 92%, a **média** de 92% e a **mínima** de 79%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (**IDO**) foi de 2,4 (nº/h), sendo que em REM foi de 4,3 (nº/h) e em NREM foi de 3,2 (nº/h). Permaneceu 4,6 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala Epworth (17), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório normal (**3,4 n°/h**) (VN= até 5 n°/h);
2. Dessaturação da oxi-hemoglobina (**79%**);
3. Latência para o início do sono diminuída (**4,0 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Aumento da latência para o início do sono REM (**123,0 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono reduzida (**70,6 %**) (VN= $\geq 85\%$);
6. Índice de despertares normal (**8,2 n°/h**) (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 normal (**2,4 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 normal (**55,0 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta normal (**20,6 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM normal (**22,0 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco intenso, constante verificado via sensor de ronco;
12. O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **9,0 (n°/h)**;
13. Presença de atividade em EMG de queixo.

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA


Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 9,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.57

DADOS DO PACIENTE:

Nome: ANTONIO CARLOS RIBEIRO DO VALLE
ID: 0
Altura: 1,75 m
Peso: 85 kg
Sexo: Masculino
Data de Nascimento: 28-5-1952
IMC: 27,76

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 22:20:33
Data do Exame: 14-08-2025
Médico Solicitante: DR. ANTONIO CARLOS ZAMPA

Análise do Sono

Data/Horário de Início:	14/08/2025 22:20
Data/Horário de Término:	15/08/2025 05:45
Tempo Total de Registro (TTR):	444,0
Tempo Total de Sono (TTS):	313,5
Latência para o início do sono:	4,0
Latência para o sono REM:	123,0
Tempo acordado após o adormecer:	126,5
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	70,6 %

Estágios do Sono

	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	7,5	172,5	64,5	69,0	130,5
% de TTS	2,4	55,0	20,6	22,0	29,4

Despertares		
	Número	Índice (nº/h)
Total despertares	de 61	8,2

Frequência Cardíaca		
	Média [bpm]	Máx [bpm]
REM	61,1	67
NREM	60,5	73
Vigília	64,9	79

Apneias/Hipopneias/RERAs								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	"RERA"	A + H + "RERA"
	Central	Obstrutiva	Mista					
Número	0	0	0	0	18	18	0	18
Índice	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4	0,0	3,4
Índice em REM	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	0,0	4,3
Índice em NREM	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	3,2
Duração máx (seg)	0	0	0	0	35,5	35,5	0	35,5
Duração média (seg)	0	0	0	0,0	27,7	27,7	0	27,7
Índice em Supino	0	0	0	0	4,0	4,0	0	4,0
Índice em Não Supino	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;

- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;

- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 3,4 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 3,4 (nº/h)