

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: LUIZA DEBORAH ALEXANDRINO RIBEIRO VALLE **Sexo:** Feminino
Data do Exame: 14-08-2025 **Idade:** 66 anos
Peso: 74 kg **Altura:** 1,60 m
Médico Solicitante: DRA. ANDREIA ALESSANDRA
BISANHA

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 14/08/2025 22:21 e finalizado às 15/08/2025 05:45.

A latência para início do sono foi de **7,0 min** e a latência para o sono REM de **53,5 min**.

O tempo total de sono (TTS) foi de 351,5 min, com eficiência do sono de **79,3 %**.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **1,7 %** de estágio N1, **53,3 %** de estágio N2, **23,0 %** de estágio N3 e **21,9 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 84,5 min. Ocorreram 34 despertares, sendo o índice de **4,6 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 60, sendo 8 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 52 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **10,2 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 24,2 e o IDR durante o sono NREM foi de 6,3. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 10,2 (nº/h), sendo 1,4 apneia/h e 8,9 hipopneia/h.

A **saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂)** basal foi 95%, a **média** de 93% e a **mínima** de 87%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (**IDO**) foi de 7,8 (nº/h), sendo que em REM foi de 22,6 (nº/h) e em NREM foi de 6,3 (nº/h). Permaneceu 1,3 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (11), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório leve (**10,2 n°/h**) (VN= até 5 n°/h);
2. Dessaturação da oxi-hemoglobina (**87%**);
3. Latência para o início do sono normal (**7,0 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Diminuição da latência para o início do sono REM (**53,5 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono diminuída (**79,3 %**) (VN= $\geq 85\%$);
6. Índice de despertares normal (**4,6 n°/h**) (VN= até 15 n°/h);
7. Diminuição do percentual do estágio N1 (**1,7 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 normal (**53,3 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta normal (**23,0 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM normal (**21,9 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco leve, intermitente verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA


Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 4,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

DADOS DO PACIENTE:

Nome: LUIZA DEBORAH ALEXANDRINO RIBEIRO VALLE
ID: 0
Altura: 1,60 m
Peso: 74 kg
Sexo: Feminino
Data de Nascimento: 19-8-1959
IMC: 28,91

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 22:21:41
Data do Exame: 14-08-2025
Médico Solicitante: DRA. ANDREIA ALESSANDRA BISANHA

Análise do Sono	
Data/Horário de Início:	14/08/2025 22:21
Data/Horário de Término:	15/08/2025 05:45
Tempo Total de Registro (TTR):	443,0
Tempo Total de Sono (TTS):	351,5
Latência para o início do sono:	7,0
Latência para o sono REM:	53,5
Tempo acordado após o adormecer:	84,5
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	79,3 %

Estágios do Sono					
	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	6,0	187,5	81,0	77,0	91,5
% de TTS	1,7	53,3	23,0	21,9	20,7

Despertares			
		Número	Índice (nº/h)
Total despertares	de	34	4,6

Frequência Cardíaca		
	Média [bpm]	Máx [bpm]
REM	63,3	85
NREM	61,2	87
Vigília	64,0	188

Apneias/Hipopneias/RERAs								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	"RERA"	A + H + "RERA"
	Central	Obstrutiva	Mista					
Número	0	8	0	8	52	60	0	60
Índice	0,0	1,4	0,0	1,4	8,9	10,2	0,0	10,2
Índice em REM	0,0	4,7	0,0	4,7	19,5	24,2	0,0	24,2
Índice em NREM	0,0	0,4	0,0	0,4	5,9	6,3	0,0	6,3
Duração máx (seg)	0	26,7	0	26,7	33,2	33,2	0	33,2
Duração média (seg)	0	21,2	0	21,2	21,8	21,5	0	21,5
Índice em Supino	0	0	0	0	0	0	0	0
Índice em Não Supino	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;

- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;

- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 10,2 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 10,2 (nº/h)

DADOS DA OXIMETRIA		
	Média de SAO2	Menor SAO2
Sono:	93%	87%
NREM:	94%	87%
REM:	93%	88%
Vigília:	95%	84%

Valor de oximetria predominante durante o sono: 94%

Total de dessaturações: 58

"PLMS" (Periodic limb movements in sleep)		
Movimentos periódicos de membros inferiores durante o sono		
EMG tibial bilateral	Número	Índice (nº/h)
"PLMS"	0	0,0
"PLMS" associados a despertares	0	/