

Exame do Sono Biologix

Centro credenciado

Sonofisio - SONOFISIO

Telefone

12 3921-1001

Paciente

Nome Elena Betty Gin Biasi De Miranda

Data de nasc. 29/08/1949 (72 anos)

Sexo Feminino

Exame

Início 25/08/2022 – 22:48:47

Fim 26/08/2022 – 06:02:39

Tempo total 07:13:52 (433,9 min)

Tempo válido 06:52:57 (413,0 min)

Condições na noite do exame

☐ Consumo de álcool☒ Congestão nasal☐ Sedativos☐ Nenhuma

Tratamentos na noite do exame

☒ CPAP (07:13)☐ Aparelho de avanço☐ Nenhum

Questionário do exame

Peso e altura

Respondido em 25/08/2022

Peso 65 kg

Altura 1,63 m

IMC 24,5

Sintomas

Respondido em 25/08/2022


☒ Ronco alto e frequente☒ Dificuldade para manter o sono☒ Sono agitado☒ Sono não reparador☒ Sonolência ou cansaço diurno☒ Diminuição da libido ou disfunção erétil☒ Dificuldade de concentração☐ Perda de memória☐ Nenhum

Doenças associadas

Respondido em 25/08/2022

☒ Hipertensão arterial sistêmica☐ Doença arterial coronária☒ Insuficiência cardíaca☐ Arritmia cardíaca☐ Acidente vascular cerebral (AVC)☐ Diabetes☐ Depressão☐ Refluxo gastroesofágico☐ Doença respiratória☐ Nenhuma

Resultado



Valores de referência para o IDO

IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Compatível com apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Compatível com apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Compatível com apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia tipo IV realizado no dia 25/08/2022, iniciado às 22:48 e terminado às 06:02. O tempo total de registro foi de 7h13min (433 minutos) e o tempo válido foi de 6h52min (412 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 22 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 3,2/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 95% e não permaneceu abaixo de 90% por tempo significativo. Foram detectados eventos de ronco durante 1% do tempo de registro.

Conclusão

Exame normal (IDO 3,2/hora), nas condições descritas e com o uso de CPAP.


Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Nota: considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3 pontos percentuais no nível de saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂). Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 90% durante ao menos 5 minutos com um nadir de 85%. Os índices correspondem ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.

Exame do Sono Biologix

Oximetria (SpO₂)


Histograma SpO₂ (%) × fração do tempo (%)



SpO ₂ mínima	90%
SpO ₂ média	95%
SpO ₂ máxima	100%
Tempo com SpO ₂ < 90%	0,0 min (0%)
Tempo com SpO ₂ < 80%	0,0 min (0%)
Número de dessaturações	22
Índice de dessat. de oxigênio (IDO)	3,2 /hora
Índice de hipoxemia noturna	0,00 /hora

Frequência Cardíaca (FC)


Histograma FC (bpm) × fração do tempo (%)



FC mínima	52 bpm
FC média	63 bpm
FC máxima	99 bpm

Análise de ronco

Tempo de gravação	433,0 min
Tempo com ronco	3,0 min (1%)



Polissonogramas

