

JOAO CARLOS DA SILVA BARBOSA

MEDICAMENTOS:

DM

SINTOMAS/QUEIXAS

Sonolência / cansaço.

HORA QUE DORME

HORA QUE ACORDA

SONECA DURANTE O DIA

HORARIO DAS REFEIÇÕES

CAFE:

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTA:

10/06 P= 9.4 cm H₂O
 22 JAH= 7.84 L
 m. de uso: 5h35'
 Bem adaptado

fuor

15/07 Sai as 15h - ele n tinha chego - fuor

22/07 - a máscara estava escapando muito ar
 25 Tere bruxocefalia, perdeu a respirar
 muito equilíbrio.

- ajuste do CPAP.

fuor

troco a masc. N₂₀ (L) + traqueia + filtro.

Nome: JOÃO CARLOS DA SILVA BARBOSA

Data de Nascimento: 21-1-1955

IMC: 24,61

Sexo: Masculino

Data do exame: 22-01-2022

Peso: 67 kg

Altura: 1,65 m

Médico: DR. ADRIANO MAZER

Medicamentos:

Histórico:

Audiotape Polissonografia para titulação de CPAP

realizado em 22-01-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrocardiograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e outros parâmetros. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 5h00m. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 13,0 e 10,0 minutos. O tempo total de sono foi de 379,0, eficiência de 72,5% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,9%; estágio N2: 55,4%; estágio N3: 21,9%; sono REM: 19,8%. O índice de despertares foi de 12,7/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 22,5/hora, sendo elas 16 obstrutivas, 0 mistas e 6 centrais e 126 hipopneias. A SpO2 mínima foi de 90% e máxima de 98%, permanecendo 0,6% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 54 - 80 bpm e NREM de 55 - 78 bpm.

CONCLUSÃO: O estudo do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (13), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latências para o sono normais;
4. aumento do número de despertares breves;
5. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (26,6/hora);
6. registro de ronco moderado durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 9,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157